



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Pasión por educar

ASIGNATURA:

Enfermería Clínica I

TEMA:

Place de heridas

ALUMNO:

Rafael Torres Adorno

LICENCIATURA:

Enfermería

CUATRIMESTRE:

Cuarto

Pichucalco, Chiapas a 16 de octubre del 2020

PLACE EN HERIDAS

DOMINIO / CLASE	REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 11: seguridad y protección Clase 1: infección	1. Alteración en la integridad cutánea	Diagnóstico de riesgo
	2. Exposición a brotes de enfermedades	
	3. Retención de los líquidos corporales	
	4. Inmunización inadecuada	

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE DOLOR AGUDO: Gravedad de las respuestas cognitivas y emocionales adversas observadas o referidas al dolor físico.

1.

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO: V salud percibida CLASE: III sintomatología	1.Angustia por el dolor . 2.Irritabilidad. 3.Temor a los procedimientos y equipamientos. 4.Preocupación sobre la tolerancia al dolor.	1.130605 2.130626 3.130616 4.130606	CALIFICACION MINIMA: 6 CALIFICACION MAXIMA: 10	MANTENER A: 3 moderado AUMENTAR A: 4 ligero

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>CAMPO I. Fisiológico básico.</p> <p>NIVEL E. fomento de la comodidad física.</p>	<p>0221 terapia de ejercicios: ambulación.</p> <p>*Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización,aparición,duración , frecuencia e intensidad ,así como los factores que lo alivian y agudizan.</p> <p>*Identificar la intensidad del dolor durante los movimientos en las actividades de recuperación (ejemplos tos y respiración profunda ,deambulación, transferencia a una silla).</p> <p>*Asegurarse que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de que el dolor se agrave o antes de las actividades que lo inducen .</p> <p>*Monitorizar la sedación y el estado respiratorio antes de administrar opiáceos y a intervalos regulares cuando se administren opiáceos.</p> <p>*Notificar al médico si las medidas de control del dolor o tienen éxito.</p>	<p>Alivio o reducción del dolor a un nivel aceptable para el paciente en el periodo inmediatamente posterior al daño de los tejidos tras traumatismo ,cirugía o lesión.</p>