



**Nombre de alumnos:** Deisy Domínguez Bautista

**Nombre del profesor:** Liliana Villegas López

**Nombre del trabajo:** mapa conceptual

**Materia:** psicopatología II

**Grado:** 7mo.cuatrimestre

**Grupo:** "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 06 de noviembre de 2020

# TRASTORNOS NEUROCOGNICTIVOS

## DELIRIUM

## TRASTORNO NEUROCOGNITIVO

Criterios de diagnostico

Delirium por abstinencias de sustancias

Otro delirium especificado

Delirium no especificado

mayor

Leve

Empieza con la sustancia especifica que se supone que está provocando

Se aplica a las presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un delirium

Se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de los criterios de delirium

-Se cumplen los criterios de un trastorno neurocognitivo y leve  
-la sustancias o medicamentos son capaces de producir deterioro neurocognitivo  
-el trastorno neurocognitivo no puede atribuirse a ninguna afección medica

Evidencias de un declive cognitivo significativo  
-los déficits cognitivos interfieren con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas  
-los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirium

p.ejem.  
alcohol

Provoca malestares clínicamente significativo o deterioro en la sociedad

incluye

Presentación en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico

Trastornos neurocognitivo mayor o leve inducido por sustancias/medicamentos

El nombre del trastorno va seguido del curso

Se anota "otro delirium significativo" seguido del motivo específico

p.ejem.  
delirium especificado

-Se cumplen los criterios de un trastorno neurocognitivo mayor o leve  
- el deterioro no sucede en el transcurso del delirium  
-el trastorno neurocognitivo no puede atribuirse a ninguna afección medica

El dicar el trastorno concurrente por consumo moderado o grave de la sustancia

Síndrome cerebral agudo orgánico caracterizado por un deterioro de las funciones cognitivas