



Nombre del alumno: Max Eder Gómez de los santos

Nombre del profesor: Lic. Liliana Villegas López

Nombre del trabajo: ensayo

Materia: psicopatología

Grado: 7

Grupo: "A"

PASIÓN POR EDUCAR

08/09/2020

Factores que originan un trastorno bipolar

El trastorno bipolar conocido con frecuencia en el pasado como enfermedad maniaco-depresiva es una enfermedad mental que incluye episodios de manía y depresión. Las personas con este trastorno por lo regular experimentan cambios de estado de ánimo de estar soportables a insoportable que todo les moleste que estén irritables y así se mantienen mayor parte del tiempo y casi no están normales.

Esta enfermedad aparece por lo general cuando la persona es joven. La enfermedad aparece durante la adolescencia hasta alrededor de los 20 años de edad, igual en los niños pero creo que es más común en los adolescentes porque son los que estamos más estresados, pensamos más pero no sabemos aún qué hacer y se nos ponen muchas ideas.

El trastorno bipolar es un trastorno mental que hace que las personas experimenten cambios evidentes a veces extremos en el estado de ánimo y el comportamiento. A veces, los niños con trastorno bipolar se sienten muy felices o animados y son mucho más enérgicos y activos de lo habitual. Esto se llama un episodio maníaco. Otras veces los niños con trastorno bipolar se sienten muy tristes o abatidos y son mucho menos activos de lo normal. Esto se llama episodio depresivo.

El trastorno bipolar que anteriormente se le denominaba enfermedad maniaco-depresiva o depresión maníaca no es lo mismo que los altibajos normales que experimentan todos los niños. Los cambios de humor en el trastorno bipolar son más extremos, a menudo no provocados y van acompañados de cambios en el sueño, el nivel de energía y la capacidad de pensar con claridad. Los síntomas bipolares pueden dificultar que los jóvenes se desempeñen bien en la escuela o que se lleven bien con sus amigos y familiares. Algunos niños y adolescentes con trastorno bipolar pueden intentar hacerse daño o suicidarse.

En la mayoría de las personas, el trastorno bipolar se diagnostica en la adolescencia o en la edad adulta, pero los síntomas pueden aparecer antes durante la infancia. A menudo el trastorno bipolar es episódico pero generalmente dura toda la vida. Ya durante toda la vida se toman otras medidas más adecuadas ahí si no sé muy bien.

Los indicios y los síntomas del trastorno bipolar pueden coincidir con los de otros trastornos que son frecuentes en los jóvenes como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, problemas de conducta, depresión mayor y trastornos de ansiedad. El diagnóstico del trastorno bipolar puede ser complicado y requiere una evaluación cuidadosa.

y exhaustiva por parte de un profesional de la salud mental capacitado y con experiencia pero a mi punto de vista esta enfermedad le ocasiona más molestia a los adolescentes porque somos los que más estamos afectados pensamos nos estresamos con las escuela tenemos más problemas y más preocupaciones y noes estresamos más.

Ahora hablaremos de algunas de las causas del trastorno bipolar de sus causas y consecuencia y que provoca esta enfermedad pero en lo que investigamos nos dice que se desconocen las causas exactas del trastorno bipolar pero hay varios factores que pueden contribuir a la enfermedad los cuales hablaremos lo siguiente.

por ejemplo los investigadores están comenzando a descubrir mecanismos genéticos relacionados con el trastorno bipolar y otros trastornos mentales diversas investigaciones muestran que la probabilidad de que las personas tengan un trastorno bipolar es mayor si tienen un familiar cercano con la enfermedad lo que puede obedecer a que tienen las mismas variaciones genéticas sin embargo solo porque un miembro de la familia tiene el trastorno bipolar no significa que otros miembros de esa familia lo tendrán hay muchos genes implicados en el trastorno pero no hay un solo gen que lo causa.

Las investigaciones también sugieren que la adversidad el trauma y los acontecimientos estresantes de la vida pueden aumentar la posibilidad de presentar el trastorno bipolar en personas con un riesgo genético de tener la enfermedad.

Algunos estudios de investigación han encontrado diferencias en la estructura y la función del cerebro en las personas que tienen trastorno bipolar y las que no lo tienen los investigadores están estudiando el trastorno para aprender más sobre sus causas y tratamientos eficaces.

Referencias:

Antología

Diapositivas