

Nombre de alumno: Daniela Morales Arias

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre del trabajo: trastornos de alimentación

Materia: Psicopatología II

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 7° cuatrimestre

trastorno	definición	característica	Sintomatología	Criterio diagnostico	tratamiento
Pica	Ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un período mínimo de un mes.	Las sustancias que típicamente se suelen ingerir tienden a variar con la edad y con la disponibilidad y podrían ser papel, jabón, ropa, pelo, cuerdas, etc.	Dolor de estómago, náuseas y distensión abdominal causada por obstrucción en el estómago o intestino.	el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental (p. ej., discapacidad intelectual [trastorno del desarrollo intelectual], trastorno del espectro Autista, esquizofrenia)	Una forma de tratamiento asocia el comportamiento de la pica con consecuencias negativas o castigo (terapia de aversión leve); luego, la persona es recompensada por comer alimentos normales
Trastorno de rumiación.	Regurgitación repetida de alimentos durante un período mínimo de un mes.	Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o se escupen.	los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental (ej., discapacidad intelectual [trastorno del desarrollo intelectual], trastorno del neurodesarrollo).	el diagnóstico puede realizarse en base a la información referida por el paciente o corroborada por los padres o los cuidadores. Los individuos pueden describir el comportamiento como habitual o fuera de su control.	Se utiliza la terapia conductual de inversión del hábito para tratar a personas sin discapacidades del desarrollo que tienen síndrome de rumiación.
Trastorno de evitación	falta de interés aparente por comer o alimentarse; evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos; preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer	la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada.	1. Pérdida de peso significativa. Deficiencia nutritiva significativa. 3. Dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral.	La principal característica diagnóstica del trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos es la evitación o restricción de la toma de alimentos manifestada por un fracaso clínicamente	El tratamiento es con psicoterapia, ansiolíticos y antidepresivos.

Anorexia nerviosa	Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado.	Miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo.	Alteración en la forma en que uno mismo se percibe	Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual.	Suele llevarse a cabo mediante un abordaje en equipo, que incluye médicos, profesionales de salud mental y dietistas, todos con experiencia en trastornos de la alimentación.
Bulimia nerviosa	Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes: 1. Ingestión, en un período determinado 2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio	Comportamientos Compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo.	Los atracones y Los comportamientos Compensatorios inapropiados se producen, de promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses.	Le conceden una importancia excesiva al peso o a la constitución corporal en su autoevaluación, y estos factores son, por lo general, extremadamente importantes para determinar su autoestima	consiste en antidepresivos y terapia

