



Nombre de alumnos: Deisy Domínguez Bautista

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: psicopatología II

Grado: 7mo.cuatrimestre

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 29 de noviembre de 2020

TRASTORNO	DEFINICION	CARACTERISTICAS	CRITERIO DE DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
PICA	El trastorno de pica es una enfermedad psiquiátrica en la que el paciente ingiere sustancias que no son nutritivas, como tierra, piedras, papel o sustancias biológicas	<ul style="list-style-type: none"> • La principal característica de la pica es la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un período mínimo de 1 mes (Criterio A) que es suficientemente grave como para justificar la atención clínica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ingestión persistente de sustancias no nutritivas, periodo de 1 mes. - El comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente. - Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental 	supervisión médica, este tratamiento no se entiende sin la figura de un psicólogo y/o psiquiatra experto en el tratamiento de la conducta alimentaria.
TRASTORNO DE RUMIACION	Afección en la que una persona expulsa la comida del estómago, vuelve a masticarla y la traga de nuevo o la escupe. Suele ocurrir en un período de 30 minutos después de cada comida.	<ul style="list-style-type: none"> • La principal característica del trastorno de rumiación es la regurgitación repetida de alimentos, después de alimentarse o comer, durante un período mínimo de un mes (Criterio A) 	<ul style="list-style-type: none"> - Regurgitación repetida de alimentos - Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o se escupen. - Si los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental 	El tratamiento puede incluir terapia conductual o medicamentos .
TRASTORNO DE EVITACION /RESTRICCIÓN DE LA INGESTA DE ALIMENTOS	Es un trastorno alimentario que se caracteriza por ingerir muy poca cantidad de alimento y/o evitar el consumo de ciertos alimentos.	La principal característica es la toma de alimentos (Criterio A), manifestada por un fracaso clínicamente significativo para obtener las necesidades nutritivas, o una ingesta energética insuficiente mediante la ingesta oral de alimentos.	<ul style="list-style-type: none"> -Trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos - Pérdida de peso significativa - Deficiencia nutritiva significativa. - El trastorno de la conducta alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa o la bulimia 	Las intervenciones tempranas se recomiendan. En todos los casos, se debe realizar una evaluación integral e iniciar un tratamiento multidisciplinario del paciente, sin dejar a un lado el apoyo al grupo familiar.

<p>ANOREXIA NERVIOSA</p>	<p>Trastorno de origen neurótico que se caracteriza por un rechazo sistemático de los alimentos y que se observa generalmente en personas jóvenes; suele ir acompañado de vómitos provocados, adelgazamiento extremo y, en el caso de las mujeres, desaparición de la menstruación.</p>	<p>tiene tres características básicas: la restricción de la ingesta energética persistente, el miedo intenso a ganar peso o a engordar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo - Miedo intenso a ganar peso o a engordar - Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual. 	<p>Puede ser necesario un tratamiento médico para volver al peso normal. La terapia conversacional puede ayudar con la autoestima y los cambios en el comportamiento.</p>
<p>BULIMIA NERVIOSA</p>	<p>Bulimia nerviosa es un trastorno alimenticio y psicológico caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables, consumiendo comida</p>	<p>Hay tres características principales de la bulimia nerviosa: los episodios recurrentes de atracones (Criterio A), los comportamientos compensatorios inapropiados y recurrentes para evitar el aumento de peso (Criterio B) y criterio (D).</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Episodios recurrentes de atracones -Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso. -La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. 	<p>El tratamiento consiste en antidepresivos y terapia</p> <p>El tratamiento consiste en terapia profesional, medicamentos y educación nutricional.</p>
<p>TRASTORNO DE ATRACONES</p>	<p>Es una condición en la cual la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor de lo normal, todo al mismo tiempo. La persona se siente fuera de control</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La característica principal del trastorno de atracones son los episodios recurrentes de atracones que deben producirse, de promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses (Criterio D). 	<p>Los episodios de atracones se asocian a tres (o más) de los hechos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comer mucho más rápidamente 2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. 	<p>El tratamiento consiste en terapia profesional, medicamentos y educación nutricional.</p>

