



TEMA: SUPER NOTA

DOCENTE: DR. Bataz Morales Rodolfo

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

“Pasión por
Educar”

ALUMNA: ANA ESTRELLA PÉREZ SÁNCHEZ

MODULO: psicopatología II

CARRERA: PSICOLOGÍA

MODALIDAD: SABADO

CUATRIMESTRE: 7MO

FECHA
16/10/20



capacidad reducida para dirigir, centrar, mantener o desviar la atención



y la conciencia
orientación
reducida al
entorno



DELIRIUM

Tipos de delirium

Delirium por abstinencia de sustancia

delirium especificado

Delirium no especificado

Trastorno de depresión mayor

Trastorno específico del aprendizaje y otros

trastornos del neurodesarrollo.

Trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por sustancias /medicamentos

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL DELIRIUM



TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y DE LA INGESTA DE ALIMENTOS.

Pica



Ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un período mínimo de un mes.

Trastorno de rumiación.



Regurgitación repetida de alimentos durante un período mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o se escupen.

SÍNTOMAS TRASTORNOS ALIMENTICIOS

WWW.RYAPSIKOLOGOS.NET

EMOCIONES

Baja autoestima, deseos de ser perfecto/a, irritabilidad, mal-humor, culpabilidad, ansiedad, impulsividad e inestabilidad emocional (bulimia).

PENSAMIENTO

Preguntas constantes a los demás sobre cómo se ven, comparación con otros, negación de que existe un problema, incapacidad para concentrarse.

CONDUCTA

Retraimiento social, comentarios de sentirse gorda/o cuando el peso es normal o bajo, reocupación por la comida, peso, conteo de calorías, intolerancia hacia los demás.

CUERPO

Continúa y prolongada reducción de peso (anorexia), delgadez extrema y desnutrición (piel reseca, color grisáceo o amarillento, uñas quebradizas, debilitamiento o caída de cabello), intolerancia al frío, bajas temperaturas en pies y manos, lesiones o pérdida del esmalte de los dientes (bulimia), rozadura en las articulaciones interfalángicas de los dedos utilizados para inducir el vómito (bulimia).

LOS PRINCIPALES TRASTORNOS ALIMENTICIOS SON LA ANOREXIA, LA BULIMIA Y LA COMPULSIÓN PARA COMER.



Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos

falta de interés aparente por comer o alimentarse; evitación de los alimentos; preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer



-  • Anorexia
-  • Bulimia
-  • Obesidad
-  • Atracones