

“MATERIA”: psicopatología.

NOMBRE DEL DOCENTE: Rodolfo Bataz
Morales

ALUMNO: Marlene Aguilar Solórzano.

CUATRIMESTRE: séptimo

LICENCIATURA: psicología

SEMIESCOLARIZADO

Trastornos neurocognitivos:

se refiere como delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos) comienzan con el delirium, seguido de los síndromes del TNC mayor, el TNC leve y sus subtipos etiológicos.



Los TNC:

son los que la disfunción cognitiva no ha estado presente desde el nacimiento o la infancia temprana y, por tanto, representa un declive desde un nivel de funcionamiento adquirido previamente.

Demencia:

es utilizado habitualmente para trastornos como las demencias degenerativas que habitualmente afectan a las personas mayores, el término trastorno neurocognitivo se utiliza ampliamente y a menudo se prefiere para los trastornos que afectan a sujetos más jóvenes, como la disfunción secundaria a un traumatismo cerebral o a la infección por el VIH.



Deirium:

es un síndrome cerebral orgánico agudo, caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas, depresión del nivel de conciencia, trastornos de la atención e incremento o disminución de la actividad psicomotora.



Especificaciones:

1. Delirium por intoxicación por sustancias.
2. Delirium por abstinencia de sustancia.
3. Delirium inducido por medicamento.
4. Delirium debido a otra afección médica.
5. Delirium debido a etiologías múltiples.



delirium especificado

delirium que provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del delirium ni de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos neurocognitivos.



Delirium no especificado:

se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento 92 de los criterios de delirium.

Trastornos de la conducta alimentaria:

el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atracones.



Trastornos de rumiación:

Regurgitación repetida de alimentos durante un período mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o se escupen.



Trastorno de apego reactivo:

Trastorno del espectro autista. Los individuos con trastorno del espectro autista a menudo presentan comportamientos alimentarios rígidos y un aumento de las sensibilidades sensoriales.

