



Nombre de alumno: Fabiola Elizabeth Pérez Morales

Nombre del profesor: Bataz Morales Rodolfo.

Nombre del trabajo: mapa conceptual unidad I y II.

Materia: Psicopatología II.

Grado: 7° cuatrimestre

Grupo: LPS19SDC0118-H

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de septiembre del 2020.

Generalidades,
trastornos de bipolaridad
y otros T. relacionados.

Generalidades.

En

1844 fue publicado el DSM como una clasificación estadística de los pacientes mentales.

Posteriormente.

Evolucionaron en 5 ediciones de clasificaciones de diagnóstico.

Brindando.

Las directrices diagnósticas para fundamentar las decisiones terapéuticas.

Utilización del manual.

Objetivo del DSM

Ayudar a los profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes.

Permiten

La elaboración de un plan de tratamiento fundamentado

Trastorno mental.

Es un

síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo.

Se manifiesta en

Disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo mental.

Trastorno bipolar.

Este

Trastorno se encuentra separado del T. Depresivo, en este capítulo se incluyen los siguientes diagnósticos.

T. Bipolar.

Criterios diagnósticos

EPISODIO MANIACO

Un período bien definido de estado de ánimo anormal. Dura como mínimo una semana y se presenta todo el día.

EPISODIO HIPO-MANIACO

Dura mínimo 4 días consecutivos en donde la alteración del estado de ánimo es observada por otras personas, pero no causa alteración en el funcionamiento social o laboral.

EPISODIO DE DEPRESIÓN MAYOR

Se presenta durante 1 semana o más y se caracteriza por un estado de ánimo deprimido y pérdida de interés.

T. Bipolar II.

Criterios diagnósticos

Presencia de episodios hipomaniacos o de depresión mayor.

Se caracteriza

por un curso clínico con episodios afectivos recurrentes consistentes en uno o más episodios de depresión mayor y mínimo 1 episodio hipo-maniaco.

T. Ciclotímico.

Es una

alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo que conlleva numerosos períodos de síntomas hipomaniacos y períodos de síntomas depresivos que son distintos entre sí

T. Depresivo.

Dentro de este trastorno se encuentran, los siguientes.

- T. de desregulación disruptiva del estado de ánimo.
- T. depresivo persistente (distimia)
- T. Depresivo mayor.
- T. disfórico premenstrual

Rasgo en común.

La presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo.

Diferencia.

- El periodo de duración.
- la presentación temporal.
- La supuesta etiología.

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos.

Trastorno delirante.

Característica

presencia de uno o más delirios que persisten durante al menos 1 mes.

Tipos

1. Erotomaniaco.
2. De grandeza.
3. Celotípico.
4. Persecutorio.
5. Somático.
6. Mixto.
7. No especificado.

Trastorno psicótico breve.

Criterios diagnósticos.

- A. Síntomas: Delirios, Alucinaciones, Discurso desorganizado, Comportamiento desorganizado o catatónico.
- B. La duración de un episodio del trastorno es al menos de un día, pero menos de 1 mes.
- C. El trastorno no se explica mejor por un T. depresivo mayor o bipolar.

Especificaciones.

- Con factores de estrés notables.
- Sin factores de estrés notables.
- Con inicio posparto.
- Con catatonia.

Trastorno esquizofreniforme

Síntomas

6. Delirios.
7. Alucinaciones.
8. Discurso desorganizado.
9. Comportamiento muy desorganizado o catatónico.
10. Síntomas negativos

Duración total de la enfermedad.

Mínimo 1 mes, pero menos de 6 meses.

Esquizofrenia.

Síntomas

1. Delirios.
2. Alucinaciones.
3. Discurso desorganizado.
4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico.
5. Síntomas negativos

Duración de síntomas.

Síntomas recurrentes como mínimo durante 6 meses o más.

Trastorno esquizoafectivo.

Criterios diagnósticos.

- A. Un período ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo (maníaco o depresivo mayor)
- B. Delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo durante todo el curso de la enfermedad.
- C. Síntomas presentes durante la mayor parte de la duración total de las fases activa y residual de la enfermedad.
- D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia.

Catatonia.

Es una

marcada alteración psicomotora que puede conllevar una disminución de la actividad motriz, una menor colaboración durante la entrevista o la exploración física y una actividad motora excesiva y peculiar.

La catatonia.

Puede aparecer en el contexto de múltiples trastornos.

Síntomas

1. Estupor.
2. Catalepsia.
3. Flexibilidad cérea.
4. Mutismo.
5. Negativismo.
6. Adopción de una postura.
7. Manierismo.
8. Estereotipia.
9. Agitación, no influida por estímulos externos.
10. Muecas.
11. Ecolalia.
12. Ecopraxia.