



VIVES LÓPEZ SANDY AZUCENA

CARRERA: LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

7o CUATRIMESTRE

GRUPO LPS19SDC0118-H

CATEDRÁTICO: BATAZ MORALES RODOLFO

MATERIA: PSICOPATOLOGIA II

ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL

COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

23/09/2020

Clasificación según el DSM-5

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Anomalías en uno cinco dominios: **delirios**, alucinaciones, pensamiento (discurso) **desorganizado**, **comportamiento motor muy desorganizado o anómalo** (incluida la catatonia) y síntomas negativos.

T. Delirante (esquizo-típico)

Tipos: Erotomaniaco, de grandeza, celotípico, persecutorio, somático, mixto, no especificado.

T. Psicótico breve

Es una alteración que implica el inicio brusco de: Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento o psicomotor anómalo, incluyendo catatonia.

T. Esquizofreniforme

Los síntomas característicos del trastorno esquizofreniforme son idénticos a los de la esquizofrenia. El trastorno esquizofreniforme se distingue por su diferente duración.

Esquizofrenia

Los síntomas característicos de la esquizofrenia comprenden todo un abanico de disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales, aunque ningún síntoma concreto es patognomónico del trastorno.

Catatonia

Se incluye en el trastorno del neurodesarrollo, los psicóticos, los bipolares, los depresivos y otras afecciones médicas. alteración psicomotora que puede conllevar una disminución de la actividad motriz, actividad motora excesiva y peculiar.

Trastorno bipolar y trastornos relacionados

Separados de los trastornos depresivos y situados entre el capítulo dedicado al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Episodios

- Hipomaniaco
- Maniaco
- Depresivo

T. relacionados

Trastorno bipolar I, trastorno bipolar II, trastorno ciclotímico, trastorno bipolar y relacionados inducido por sustancias/medicamentos, trastorno bipolar y trastornos relacionados debido a otra afección médica, otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado, y trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado.

Trastornos depresivos

Trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, lo que puede causar dificultades significativas en la vida cotidiana.

Trastorno de depresión mayor

Ánimo deprimido la mayor parte del día, ánimo depresivo o pérdida del interés o del placer en casi todas las actividades.

Trastorno depresivo persistente

(Distimia) es un ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días, durante al menos dos años o al menos durante un año en los niños y los adolescentes.

Trastorno disfórico premenstrual

Son la expresión de labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo y que remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después.