



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

“CUADRO SINÓPTICO DE ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS”

Anelhy Jasmín Hernández Zapata

CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

Semestre: 7°

Grupo: “A”

Dr. JIMENEZ ORTEGA LUIS MAURICIO

Comitán de Domínguez, Chiapas Septiembre del 2020.

Enfermedades exantemáticas

Grupo de infecciones sistémicas, con diferentes grados de contagiosidad que tiene como característica principal la presencia de una erupción cutánea.

Eritematosos

- Fiebre escarlatoína { lesiones pequeñas lineales, en zona anterorbital (ngle y axilas) (signo de postica), exantema eritematoso generalizado, escaldado en la presión, de textura áspera
- Staphylococcemia { aparecen de manera secundaria a una lesión de la epidermis, lo que facilita infección por Staphylococcus
- Eritema infeccioso { 3 etapas: la primera se presenta exantema eritematoso en frente y mejillas, mejilla abarrotada; segunda etapa exantema es papular distal y simétrica en tronco y piernas con apariencia de ericaje y tercera etapa, erupción recurrente por varias semanas.
- Enfermedad de Kawasaki { vasculitis sistémica de la que aún no se conoce la causa, eritema difuso en mucosa orofaríngea, eritema o fisuras en los labios, exantema polimorfo, eritema o edema en palmas o plantas

Maculopapulares

- Sarampión { afección dérmica se presenta como exantema maculopapular, eritematoso, no escamoso y no purpúrico, pápulas pequeñas, de color blanco azulado con areola eritematoso (manchas de Koplik)
- Rubéola { el exantema es maculopapular rosado y se asocia a la presencia de adenomegalias con localización característica en región retroauricular y cervico suboccipital.
- Mononucleosis infecciosa { Exantema eritematoso maculopapular, puede presentarse urticariforme, buloso, morbiliforme, vesicular, petequial y purpúrico, se localizan principalmente en el tronco y brazos.
- Exantema súbito { máculas eritematosas en forma de almendra y pápulas en el tronco, cara, cuello y extremidades superiores, exantema con pápulas eritematosas en el paladar blando y úvula (manchas de Nagayama)

Enfermedades exantemáticas

Purpúricas - Petequiales y vasculitis

Púrpura fulminans

El exantema es inicialmente eritematoso y maculopapular, inicia en las extremidades y se generaliza, a exantema vascular con petequias palpables.

Síndrome de choque tóxico

La etapa entodérmica, se inicia con eritema alrededor de labios, nariz y superficies de flexión, extendiéndose en pocas horas al resto de la superficie cutánea, la piel se torna eritematosa, caliente y dolorosa, con aspecto de quemadura, la etapa ampollar, donde la piel muestra apariencia arrugada por la formación de ampollas estériles y flácidas localizadas en el interior de la epidermis superficial con signo de Nikolsky positivo.

Dengue

El exantema eritematoso purpúrico que se manifiesta en el tronco y tiene diseminación centrifuga a la cara, cuello y extremidades, el exantema usualmente ocurre 3-6 días después del inicio de la fiebre y se caracteriza por una erupción maculopapular o morbiliforme "islas blancas en un mar rojo".

Vesiculares y bulosos

- Varicela

Tiene aparición cefalocaudal, es maculopapular pruriginoso de 3-5 mm de diámetro rodeados por un halo eritematoso que rápidamente evoluciona a vesícula con apariencia de "gotas de agua".

Síndrome pie-mano-boca

El exantema se caracteriza por vesículas aciladas de 2-3 mm, con localización dorsal y lateral de los dedos, así como la superficie palmar y plantar, en la mucosa oral tiene vesículas que erosionan para formar úlceras 2 mm de diámetro.

Síndrome de piel escaldada

La piel tiene una rugosidad papel de lija, y las líneas de pasta están presentes, como en la escarlatina por estreptococos, pero la lengua de fresa y exantema palatino están ausentes.