

Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Pediatría

Yesenia Arlette López Hernández

Semestre: 7°

Grupo: A

Septiembre del 2020.

| Vacuna | Enfermedad que previene | Dosis | Edad y frecuencia al hacer. |
|--|---|--|----------------------------------|
| BCG | Tuberculosis Meningea | única | al nacer. |
| Hepatitis B | Hepatitis B | Primera | Al nacer |
| | | Segunda | 2 meses. |
| | | Tercera | 6 meses. |
| Pentavalente acelular. DPA+VPI+Vib. | Difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis e infecciones por H. influenzae. | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| | | Tercera | 6 meses. |
| | | Refuerzo. | 18 meses. |
| Rotavirus. | Diarrea por rotavirus (2 dosis) | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | Diarrea por Rotavirus (3 dosis) | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| | | Tercera | 6 meses. |
| Neumococaca Conjugada | Infecciones por neumococo. | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| | | Revacunación | 1 año. |
| Influenza. | Influenza | Primera | 6 meses |
| | | Segunda | 7 años. |
| | | Revacunación | Anual hasta los 59 meses. |
| DPT | Difteria, tos ferina y tétanos | Refuerzo. | 4 años. |
| SRP. | Sarampión, Rubéola Parotoditis. | Primera | 1 año |
| | | Segunda. | 6 años. |
| SABIN | Poliomielitis. | Adicionales primera y seg. semana nacional de Sabid. | de 6 meses a 4 años 11 meses. |
| VPH | virus del Papiloma humano. | Primera | 9 años. |
| | | Segunda | 6 meses después de la 1ª. |

| Vacuna | Enfermedad que previene. | Dosis | Edad y frecuencia. |
|---|--|---|------------------------------------|
| BCG | Tuberculosis Meningea. | Única. | Al nacer |
| Hepatitis B. | Hepatitis B. | Primera | Al nacer. |
| | | Segunda | 2 meses |
| | | Tercera | 6 meses |
| Pentavalente acelular. D Pat VPI + Hib | Difteria, tos ferina, tétanos e infecciones por H. influenzae. | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| | | Tercera | 6 meses |
| | | Refuerzo. | 18 meses |
| Rotavirus. | Diarrea por Rotavirus. (2 dosis) | Primera | 2 meses |
| | Diarrea por Rotavirus (3 dosis) | Segunda | 4 meses |
| | | Primera | 2 meses |
| Neumococaca conjugada. | Infecciones por neumococo. | Segunda | 4 meses. |
| | | Revacuación | 1 año |
| | | Primera | 2 meses |
| Influenza. | Influenza. | Segunda | 6 meses |
| | | Revacuación | 7 meses. |
| | | Primera | Annual hasta los 59 meses |
| DPT | Difteria, tétanos y Paratoditis. | Refuerzo. | 4 años. |
| SRP. | Scarupción, Rubéola Paratoditis. | Primera | 1 año. |
| SABIN | Poliomielitis. | Refuerzo. | 6 años. |
| | | Adicionales primera, segunda Semana nac. de salud. | de 6 meses - 4 años + 11 meses. |
| VPH. | Virus del papiloma Humano. | Primera | 9 años. |
| | | Segunda. | 6 meses después de la Primera |

| Vacuna | Enfermedad que previene. | Dosis | Edad y frecuencia. |
|---|--|---|------------------------------------|
| BCG | Tuberculosis Meningea. | Única. | Al nacer |
| Hepatitis B. | Hepatitis B. | Primera | Al nacer. |
| | | Segunda | 2 meses |
| | | Tercera | 6 meses |
| Pentavalente acelular. D Pat VPI + Hib | Difteria, tos ferina, tétanos e infecciones por H. influenzae. | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| | | Tercera | 6 meses |
| | | Refuerzo. | 18 meses |
| Rotavirus. | Diarrea por Rotavirus. (2 dosis) | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| | Diarrea por Rotavirus (3 dosis) | Primera | 2 meses |
| | | Segunda. | 4 meses |
| | | Tercera. | 6 meses |
| Neumococaca conjugada. | Infecciones por neumococo. | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | | Revacuación | 1 año |
| Influenza. | Influenza. | Primera | 6 meses |
| | | Segunda. | 7 meses. |
| | | Revacuación | Anual hasta los 59 meses |
| DPT | Difteria, tétanos y Paratoditis. | Refuerzo. | 4 años. |
| SRP. | Scarupción, Rubéola Paratoditis. | Primera | 1 año. |
| | | Refuerzo. | 6 años. |
| SABIN | Poliomielitis. | Adicionales primera, segunda Semana nac. de salud. | de 6 meses - 4 años + 11 meses. |
| VPH. | Virus del papiloma Humano. | Primera | 9 años. |
| | | Segunda. | 6 meses después de la Primera |

| Vacuna | Enfermedad que previene. | Dosis | Edad y frecuencia. |
|---|--|---|------------------------------------|
| BCG | Tuberculosis Meningea. | Única. | Al nacer |
| Hepatitis B. | Hepatitis B. | Primera | Al nacer. |
| | | Segunda | 2 meses |
| | | Tercera | 6 meses |
| Pentavalente acelular. D Pat VPI + Hib | Difteria, tos ferina, tétanos e infecciones por H. influenzae. | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| | | Tercera | 6 meses |
| | | Refuerzo. | 18 meses |
| Rotavirus. | Diarrea por Rotavirus. (2 dosis) | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| | Diarrea por Rotavirus (3 dosis) | Primera | 2 meses |
| | | Segunda. | 4 meses |
| | | Tercera. | 6 meses |
| Neumococaca conjugada. | Infecciones por neumococo. | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | | Revacuación | 1 año |
| Influenza. | Influenza. | Primera | 6 meses |
| | | Segunda. | 7 meses. |
| | | Revacuación | Anual hasta los 59 meses |
| DPT | Difteria, tétanos y Paratoditis. | Refuerzo. | 4 años. |
| SRP. | Scarupción, Rubéola Paratoditis. | Primera | 1 año. |
| | | Refuerzo. | 6 años. |
| SABIN | Poliomielitis. | Adicionales primera, segunda Semana nac. de salud. | de 6 meses - 4 años + 11 meses. |
| VPH. | Virus del papiloma Humano. | Primera | 9 años. |
| | | Segunda. | 6 meses después de la Primera |

| Vacuna | Enfermedad que previene | Dosis | Edad y frecuencia |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| BCG | Tuberculosis Meningea. | UNICA | al nacer |
| Hepatitis B. | Hepatitis B. | Primera | al nacer |
| | | Segunda. | 2 meses |
| | | Tercera | 6 meses |
| Pentavalente acelular. DPT+Hib+VPI | Difteria, tos ferina, tetanos e infecciones por H. influenza. | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | | Tercera | 6 meses. |
| | | Refuerzo. | 18 meses. |
| Rotavirus. | Diarrea por Rotavirus (2 dosis) | Primera | 2 meses. |
| | Diarrrea por Rotavirus (3 dosis) | Segunda. | 4 meses |
| | | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| | | Tercera | 6 meses |
| | | Primera | 2 meses. |
| Neumococaca Conjugada. | Infecciones por Neumococo. | Segunda | 4 meses |
| | | Revacunación | 1 año |
| | | Primera | 6 meses |
| Influenza. | Influenza. | Segunda | 7 meses. |
| | | Revacunación | Anual hasta los 59 meses |
| | | Refuerzo. | 4 años |
| DPT | Difteria, tetanos, Parotiditis | Primera | 1 año |
| SRP. | Sarampión, Rubéola Parotiditis. | Refuerzo. | 6 años |
| | | Adicionales Primera, Segunda semana Nac. de salud. | de 6 meses - 4 años y 11 meses. |
| SABIN | Poliomielitis. | Primera | 9 años. |
| VPH. | Virus del papiloma humano. | Segunda. | 6 meses después de la primera |

| Vacuna | Enfermedad que previene | Dosis | Edad y frecuencia |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| BCG | Tuberculosis Meningea. | UNICA | al nacer |
| Hepatitis B. | Hepatitis B. | Primera | al nacer |
| | | Segunda. | 2 meses |
| | | Tercera | 6 meses |
| Pentavalente acelular. DPT+Hib+VPI | Difteria, tos ferina, tetanos e infecciones por H. influenza. | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | | Tercera | 6 meses. |
| | | Refuerzo. | 18 meses. |
| Rotavirus. | Diarrea por Rotavirus (2 dosis) | Primera | 2 meses. |
| | Diarrea por Rotavirus (3 dosis) | Segunda. | 4 meses |
| | | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses |
| Neumococaca Conjugada. | Infecciones por Neumococo. | Tercera | 6 meses |
| | | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda | 4 meses |
| Influenza. | Influenza. | Revacunación | 1 año |
| | | Primera | 6 meses |
| | | Segunda | 7 meses. |
| DPT | Difteria, tetanos, Parotiditis | Revacunación | Annual hasta los 59 meses |
| SRP. | Sarampión, Rubéola Parotiditis. | Primera | 4 años |
| | | Refuerzo. | 1 año |
| SABIN | Poliomielitis. | Refuerzo. | 6 años |
| | | Adicionales primera, segunda semana Nac. de salud. | de 6 meses - 4 años y 11 meses. |
| VPH. | Virus del papiloma humano. | Primera | 9 años. |
| | | Segunda. | 6 meses después de la primera |

| Vacuna | Enfermedad que previene | Dosis | Edad y Frecuencia |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| BCG. | Tuberculosis Meningea | Unica | al nacer. |
| Hepatitis B. | Hepatitis B. | Primera | al nacer. |
| | | Segunda | 2 meses. |
| | | Tercera | 6 meses |
| Pentavalente acelular DPT+Hib+VPI. | Difteria, tos ferina, tetanos e influenza Por. H. influenzae. | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | | Tercera | 6 meses. |
| | | Refuerzo. | 18 meses. |
| Rotavirus. | Diarea por Rotavirus (2 dosis) | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda. | 4 meses. |
| | Diarea por Rotavirus (3 dosis) | Primera | 2 meses. |
| | | segunda | 4 meses. |
| | Tercera. | 6 meses. | |
| Neumococca Conjugada. | infecciones por Neumococa | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda. | 4 meses. |
| | | Revacunación | 1 año. |
| Influenza | Influenzae | Primera | 6 meses. |
| | | Segunda | 7 meses. |
| | | Revacunación | Anual hasta los 59 años. |
| DPT | Difteria, tetanos, Parotiditis | Refuerzo. | 4 años. |
| S.P.P. | Sarampión, Rubéola, Parotiditis. | Primera | 1 año |
| | | Refuerzo | 6 años. |
| SABIN | Poliomielitis. | Adicionales primera, segunda Semana Nac. de Salud. | 6 meses - 4 años y 10 meses. |
| VPH. | Virus del papiloma humano. | Primera | 9 años. |
| | | Segunda. | 6 meses después de la pma |

| Vacuna | Enfermedad que previene | Dosis | Edad y Frecuencia |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| BCG. | Tuberculosis Meningea | Unica | al nacer. |
| Hepatitis B. | Hepatitis B. | Primera | al nacer. |
| | | Segunda | 2 meses. |
| | | Tercera | 6 meses |
| Pentavalente acelular DPT+Hib+VPI. | Difteria, tos ferina, tetanos e influenza Por. H. influenzae. | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | | Tercera | 6 meses. |
| | | Refuerzo. | 18 meses. |
| Rotavirus. | Diarea por Rotavirus (2 dosis) | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda. | 4 meses. |
| | Diarea por Rotavirus (3 dosis) | Primera | 2 meses. |
| | | segunda | 4 meses. |
| | Tercera. | 6 meses. | |
| Neumococca Conjugada | infecciones por Neumococo | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda. | 4 meses. |
| | | Revacunación | 1 año. |
| Influenza | Influenzae | Primera | 6 meses. |
| | | Segunda | 7 meses. |
| | | Revacunación | Anual hasta los 59 años. |
| DPT | Difteria, tetanos, Parotiditis | Refuerzo. | 4 años. |
| S.R.P. | Sarampión, Rubéola, Parotiditis. | Primera | 1 año |
| | | Refuerzo | 6 años. |
| SABIN | Poliomielitis. | Adicionales primera, segunda Semana Nac. de Salud. | 6 meses - 4 años y 10 meses. |
| VPH. | Virus del papiloma humano. | Primera | 9 años. |
| | | Segunda. | 6 meses después de la pma |

| Vacuna | Enfermedad que previene | Dosis | Edad y Frecuencia |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| BCG. | Tuberculosis Meningea | Unica | al nacer. |
| Hepatitis B. | Hepatitis B. | Primera | al nacer. |
| | | Segunda | 2 meses. |
| | | Tercera. | 6 meses |
| Pentavalente acelular DPT+Hib+VPI. | Difteria, tos ferina, tetanos e influenza Por. H. Influenzae. | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | | Tercera | 6 meses. |
| | | Refuerzo. | 18 meses. |
| Rotavirus. | Diarea por Rotavirus (2 dosis) | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda. | 4 meses. |
| | Diarea por Rotavirus (3 dosis) | Primera | 2 meses. |
| | | segunda | 4 meses. |
| | Tercera. | 6 meses. | |
| Neumococca Conjugada | infecciones por Neumococo | Primera | 2 meses. |
| | | Segunda. | 4 meses. |
| | | Revacunación | 1 año. |
| Influenza | Influenzae | Primera | 6 meses. |
| | | Segunda | 7 meses. |
| | | Revacunación | Anual hasta los 59 años. |
| DPT | Difteria, tetanos, Parotiditis | Refuerzo. | 4 años. |
| S.R.P. | Sarampión, Rubéola, Parotiditis. | Primera | 1 año |
| | | Refuerzo | 6 años. |
| SABIN | Poliomielitis. | Adicionales primera, segunda Semana Nac. de Salud. | 6 meses - 4 años y 10 meses. |
| VPH. | Virus del papiloma humano. | Primera | 9 años. |
| | | Segunda. | 6 meses después de la pma |

| Vacuna | Enfermedad que previene | Dosis | Edad y Frecuencia. |
|---|--|---|---------------------------------|
| BCG. | Tuberculosis Meningea | única | al nacer. |
| Hepatitis B. | Hepatitis B. | Primera | al nacer. |
| | | Segunda | 2 meses. |
| | | Tercera. | 6 meses. |
| Pentavalente aceldar. DPT + VPi + Hib. | Difteria, tetanos, tos ferina e infecciones por H. influenzae. | primera | 2 meses. |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | | Tercera. | 6 meses. |
| | | Refuerzo. | 18 meses. |
| Rotavirus. | Diarrea por Rotavirus (2 dosis) | primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | Diarrea por Rotavirus (3 dosis). | primera | 2 meses |
| | | segunda. | 4 meses. |
| | | Tercera. | 6 meses. |
| Neumococcos conjugada. | Infecciones por Neumococo. | Primera | 2 meses |
| | | Segunda | 4 meses. |
| | | Revacuación | 1 año |
| Influenza. | Influenza. | Primera | 6 meses |
| | | segunda | 7 meses |
| | | Revacuación | Anual hasta los 59 meses. |
| DPT | Difteria, tetanos, Paratoditis. | Refuerzo. | 4 años. |
| SRP | Sarampión, Rubéola Paratoditis. | Primera. | 1 año |
| | | Refuerzo. | 6 años. |
| SABIN. | Polio mielitis | Adicionales primera segunda Sema. Nacional de Salud. | 6 meses - 4 años y 11 meses. |
| VPH | Virus del papiloma humano. | Primera | 9 años. |
| | | Segunda. | 6 meses después de la primera. |