



**Universidad del Sureste  
UDS**



**Medicina Veterinaria Zootecnista**

**Farmacología y Veterinaria II**

**Catedrático (a): Marco Gordillo**

**Enfermedad inflamatoria intestinal en especies menores**

**Trabajo: investigación**

**Presenta: Dennis Álvaro Guzmán**

**4to. Cuatrimestre**

**Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 23 de noviembre de 2020**

## **Colitis en perros**

La diarrea es uno de los motivos más frecuentes de consulta. No siempre es fácil llegar a un diagnóstico definitivo, principalmente en el caso de las diarreas crónicas. El tratamiento depende del tipo de diarrea, siendo de especial importancia el uso de una dieta adecuada. La colitis es la inflamación que se produce en el colon. El colon es la parte del intestino grueso en la que más agua se absorbe, así que cuando se inflama suelen aparecer diarreas de gran contenido acuoso.

La colitis en perros puede presentarse de dos formas:

- Aguda: con aparición repentina y corta duración.
- Crónica: presente por lo menos de dos a tres semanas o recurrente.

Dado que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad de causa indeterminada se llega al diagnóstico descartando otras enfermedades, tanto metabólicas como infecciosas y al final su diagnóstico se basa en demostrar mediante una biopsia intestinal que existe inflamación.

Además la biopsia nos servirá para clasificar en subtipos según las células inflamatorias que predominen: enteritis linfocítico-plasmática, colitis linfocítico-plasmática, gastroenteritis eosinofílica, colitis eosinofílica, granulomas eosinofílicos, síndrome hipereosinofílico, colitis histiocítica, colitis granulomatosa, enterocolitis granulomatosa transmural y colitis supurativa.

## **Etiología de la colitis**

No podemos apuntar a una única causa por la que sobreviene la colitis en perros.

De hecho, una colitis tiene varias causas:

Factores de la dieta: exceso de ingesta de comida, cambios en la dieta, consumo de alimentos pasados o baja calidad de los mismos.

Presencia de parásitos: diferentes gusanos residentes en el intestino pueden ser los causantes.

Infección: virus y bacterias son causas comunes de colitis en perros.

Inflamaciones por intolerancias y alergias.

Ingesta de fármacos y de otras sustancias: al administrar antibióticos y otro tipo de medicinas la flora intestinal se resiente.

Enfermedades: una patología que afecte al intestino.

Presencia de traumas o agentes externos dentro del cuerpo del animal: ingerir algún objeto, tener alguna herida...

Es difícil determinar exactamente cuál es la causa y suele pasar que las colitis en perros se cure sin intervención y sin conocer qué lo ha producido finalmente. No obstante, se puede decir que es mucho más común la colitis en perros por causa dietética, por infecciones o por parásitos. Lo normal en este tipo de colitis es que el perro no pierda sus ganas de ingerir comida.

## **Fisiopatía de colitis en caninos**

En general los síntomas de colitis en perros son un aumento en la frecuencia de las deposiciones con un volumen menor, presencia de moco en las heces, no suele haber vómitos asociados, es común que aparezca sangre fresca en las heces, y tampoco suele haber pérdida de peso y si la hay es debida a la deshidratación (en los casos de diarrea aguda).

### Diagnostico

Si vemos que la colitis de nuestro perro no remite o si este es cachorro, anciano o presenta alguna enfermedad ya diagnosticada, debemos acudir a nuestro veterinario para que inicie el protocolo de diagnóstico en el que se pueden incluir pruebas como la analítica de sangre, la ecografía, las radiografías, la endoscopia o la biopsia. También es interesante el estudio coprológico, es decir, el análisis de las heces en las que podemos encontrar parásitos.

En ocasiones se deberán recoger muestras de varios días para conseguir visualizar al microscopio el parásito. Otras veces la dificultad de determinar la causa exacta lleva a establecer un tratamiento empírico, como puede ser una dieta alimentaria

especialmente formulada para problemas intestinales. Si funciona se da por cierto el diagnóstico y, si no, se debe seguir buscando otra causa de colitis en perros.

## **Tratamiento farmacológico**

En general el tratamiento es sintomático, reposición de líquidos (oral o intravenoso si hay síntomas de alarma o deshidratación) y realización de ayuno de alimentos sólidos durante 24 a 48 horas. Opcionalmente puede administrarse [loperamida] para disminuir la frecuencia de la diarrea pero no debe hacerse en caso de sospechar un cuadro producido por toxinas.

Mesalazina 15mg/ kg cada 12 horas por via oral por 4 semanas

Prednisona 2mg/kg cada 12 horas por via oral por 4 semanas

## Referencias

*ADVANCE*. (s.f.). Obtenido de <https://www.affinity-petcare.com/advance/es/perro/colitis-en-perros-causas-mas-frecuentes-y-recomendaciones#:~:text=%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20se%20producen%20las,baja%20calidad%20de%20los%20mismos.>

*portalveterinaria*. (22 de 03 de 2004). Obtenido de <https://www.portalveterinaria.com/articoli/articulos/16893/colitis-linfocitica-plasmocitica-en-perros-evaluacion-clinica-de-dos-terapias-medicas.html>

*vetsandclinics*. (s.f.). Obtenido de [https://www.affinity-petcare.com/vetsandclinics/es/colitis-perros-sintomas-diagnostico-y-tratamiento#:~:text=En%20general%20los%20s%C3%ADntomas%20de,debida%20a%20la%20deshidrataci%C3%B3n%20\(en](https://www.affinity-petcare.com/vetsandclinics/es/colitis-perros-sintomas-diagnostico-y-tratamiento#:~:text=En%20general%20los%20s%C3%ADntomas%20de,debida%20a%20la%20deshidrataci%C3%B3n%20(en)