



Universidad del Sureste

Licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia

Cuarto cuatrimestre

Farmacología veterinaria II

Actividad de plataforma

Luis Enrique Trujillo Palacios

M.V.Z.

14 de diciembre de 2020

características generales	usos	dosis	vías de administración	Toxicidad.
TRIMEPRAZINA	acciones analgésicos Potencia los anestésicos		vía oral, rectal, intramuscular e intravenosa	
PREDNISOLONA	Tratamiento adyuvante en artritis, patologías crónicas respiratorias, hepatopatías, dermatosis alérgicas, procesos oncológicos, procesos autoinmunes como pénfigo y otros procesos inflamatorios en gatos y perros.	Dosis en gatos 1 – 2 mg/kg y en perros 0,5 – 1 mg/kg., una o dos veces al día La dosis debería ser indicada para cada paciente de acuerdo a la severidad de los signos, la duración del tratamiento que se pretende y la tolerancia del individuo a la posibilidad de exceso. En casos crónicos, se deberá emplear la dosis más baja que ayude a mejorar la condición y se aconseja no interrumpir abruptamente el tratamiento.	Vía de administración oral.	Administrados Junto con glucósidos digitálicos aumenta la posibilidad de intoxicación por digitálicos
BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO	acción mucolítica, expectorante y antitusígena para su uso en caninos y felinos con afecciones respiratorias.	La dosis recomendada de dextrometorfa no es de 2 mg/kg La dosis recomendada de bromhexina u ambroxol es de 2.5 mg/kg	Via oral	No exceder dosis de 20 mg/kg.
FOSFATÓ DE	Algas por	20 a 30 mL	intramuscular o	

CODEÍNA	afecciones reumáticas, cefaleas u odontalgias. Dolores ulteriores a intervenciones quirúrgicas, espasmos del aparato gastrointestinal, conductos biliares, riñones y vías urinarias. Estados febriles.		intravenosa	
BUTOPIPRINA	Facilita la expectoración, es un fluidificante bronquial y antitusivo.	En perros con peso entre 210-12 Kg, la dosis es de 0,02 g. en comprimidos que se administran 1-3 veces al día.	Via Oral	Es un medicamento peligroso.
GUAIFENESINA	Expectorante y mucolítico en afecciones broncopulmonares, que muestran como parte de su sintomatología traqueo bronquitis, bronquitis y sinusitis. Actúa como coadyuvante de la terapia antibiótica relacionada con afecciones de las vías respiratorias.	1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 12 o 24 horas hasta la desaparición de los signos clínicos a criterio del Médico Veterinario	Via Oral	
HIDRATO DE TERPINA	Tiene efecto mucolítico y expectorante.		piel, aparato digestivo, vía subcutánea, intramuscular y pulmonar	