



Universidad del Sureste



Medicina Veterinaria y Zootecnia

Delia escamilla Méndez

Farmacología y Veterinaria II

QFB. Marco Gordillo Benavente

Tuxtla Gutiérrez Chiapas

04/Dic/2020

Fármacos	Características generales	Usos	Dosis	Vías de administración	Toxicidad
Trimeprazina	Combinación de antihistamínico fenotiacínico y corticosteroide	empleado como antitusivo	En general, y para todas las especies se utiliza por todas las vías a razón de 1,1 – 4,4 mg/Kg cada 6 horas.	Todas las vías	-
Prednisolona	Combinación de antihistamínico fenotiacínico y corticosteroide	empleado como antitusivo	En general, y para todas las especies se utiliza por todas las vías a razón de 1,1 – 4,4 mg/Kg cada 6 horas.	Todas las vías	-
Bromhidrato de dextrometorfano	se usa para aliviar temporalmente la tos causada por el resfriado común, la gripe y otras afecciones.	El dextrometorfano pertenece a una clase de medicamentos llamados antitusivos.	Perro: 1-2 mg/Kg de peso, 3-4 veces al día. • Gato: 2 mg/Kg IV.	Se administra PO	-
Fosfato de codeína) Es un opioide para la analgesia, tos y a veces, diarrea en perros y felinos.	Hace que el centro de la tos en el bulbo se deprima hasta el punto de ser poco receptivo a los estímulos	Caninos: o Antitusivo: 1 – 2 mg/Kg PO cada 6 - 12 horas. Se puede necesitar el aumento de la dosis para lograr eficacia satisfactoria. o Como analgésico: 0,5 – 2 mg/Kg PO cada 6 – 12 horas para dolor agudo leve a moderado. Puede combinarse con acetaminofeno. Felinos: No se utiliza este producto en combinación con	Subcutanea Via oral	

			acetaminofe no. o Como analgésico: 0,5 – 2 mg/Kg PO cada 6 – 8 horas para dolor agudo leve a moderado		
Butopirina	-	Facilita la expectoración, es un fluidificante bronquial y antitusivo.	En perros con peso entre 210-12 Kg, la dosis es de 0,02 g. en comprimidos que se administran 1-3 veces al día.	Via oral	Es un medicamento peligroso.
Guaifenesina	Es un derivado del alquitrán de madera que disminuye la adhesividad del moco contra las paredes del tracto respiratorio	expectorante cuando se administra PO	100-200 mg PO cada 6 horas.	po	Ocasiona inducción y recuperación libres de excitación de la anestesia en caballos. Potencia la actividad de los agentes preanestésicos y anestésicos.
Hidrato de terpina	En dosis elevadas se utiliza para las bronquitis donde se observa mucha secreción	Bronquitis fluidificar las secreciones bronquiales.	Como desecante en dosis altas, 500 mg - 1 g; como expectorante la dosis es de 100 - 400 mg/Kg de peso.	Todas	-