

FÁRMACOS	INDICACIONES	ESPECIES	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Metoclopramida	Vómitos diversas etiologías, náuseas, vaciado gástrico, esofagitis.	Perros y gatos.	Es de 0.1 a 0.5 mg/Kg, el gotero administra 20 gotas por mL, en la práctica administrar 5 a 25 gotas por cada 10 kg de peso.	Vía oral cada 6 horas como antiemético y de una hora a 30 minutos antes de cada comida como procinético.
Cisaprida	Trastornos hipomotilidad gástrica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, variedad de trastornos gastroparéticos, útil para tratar el estreñimiento idiopático crónico y la hipomotilidad del colon.	Perros, gatos, conejos	Caninos y felinos: 1 mg / kg de peso corporal. Equivalente a 1mL por cada 5 kg. La duración del tratamiento es de 1 a 5 días dependiendo del estado general del paciente. Conejos: 1 a 4 gotas por kg de peso corporal cada 8 a 12 horas. Equinos: 0.1 a 0.4mg/kg de peso corporal. Lo que equivale a 1mL por cada 20 kg de peso corporal a dosis media.	Vía oral, administrar 30 minutos antes de ingerir alimento.
Ondansetron (Ondantron)	Antiemético indicado en el control de náuseas y vómitos severo de origen citotóxico y	Perros y gatos.	0.1 a 0.15 mg/ kg de peso corporal. Equivalente a 0.5 mL por cada 10 kg de peso corporal en dosis	Intramuscular o Intravenosa lenta.

	gastroentérico como, parvovirus, enteritis en general, gastroenteritis hemorrágica, quimioterapia, así como tratamiento postquirúrgico		baja o 1 mL por cada 14 kg de peso corporal en dosis alta. Cada 12 h. durante 2 o 3 días	
Laxante Bisacodilo (Bisacodyl)	Laxante para tratar el estreñimiento; usa para estimular las deposiciones en animales con estreñimiento o cuando es necesario vaciar el intestino grueso.	Perros y gatos.	disponible en tabletas de 5 mg, supositorios rectales de 5 mg y 10 mg y botellas de enema de 10 mg / 30 ml.	Vía Oral, Anal
Laxante Picosulfato sódico	Alivio sintomático del estreñimiento ocasional, facilitar la evacuación intestinal en caso de hemorroides.	Perros y gatos.	Cada ml (15 gotas) contiene: Picosulfato de sodio: 7,5 mg	Vía oral
Laxante Metamicil	Laxante formador de masa, utilizado para tratar cólicos, diarreas acuosas abundantes y alteraciones gastrointestinales.	Perros, gatos, caballos	Disponible en tabletas de 500 mg y 1000 mg (también contiene extracto de malta de cebada, acacia y tiamina), a granel está disponible, y se usa principalmente en	Vía oral

			horas, en cubos de 28 oz, 56 oz, 1 lb, 10 lb y 30 lb	
Bismuto	Antidiarreico	Perros, gatos, caballo, vacas	Vía oral, a razón de 20 mg de activo por kg de peso, 3 veces al día. En la práctica administrar en Perros y Gatos 20 ml por cada 15 kg tres (3) veces al día. En Potros y Terneros de 85 a 220 kg usar de 100 a 250 ml en tres (3) tomas al día. Administrar con jeringa apropiada de plástico o con sonda, evitando la aspiración pulmonar.	Vía oral
Loperamida	Antidiarreico, Para tratar el síndrome diarreico.	Perros, gatos	Administrar 0,1 ml/kg: 1 gota por kg cada 8 horas.	Vía Oral