



**Universidad del Sureste
UDS**



Medicina Veterinaria Zootecnista

Farmacología y Veterinaria II

Catedrático (a): Marco Gordillo Benavente

Presenta: Dennis Álvaro Guzmán

4to. Cuatrimestre

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 05 de diciembre de 2020

FÁRMACOS	CARACTERÍSTICAS	USOS	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Hidrato de terpina	En dosis elevadas se utiliza para las ronquitis donde se observa mucha secreción.	Bronquitis fluidificar las secreciones bronquiales.	Como desecante en dosis altas, 500 mg - 1 g; Como expectorante la dosis es de 100 – 400 mg/Kg de peso.	Vía intramuscular, venosa, oral.
Trimeprazina	Combinación de antihistamínico fenotiacínico Y corticosteroide.	Es empleado como antitusivo.	En general, y para todas las especies se utiliza por todas las vías a razón de 1,1 – 4,4 mg/Kg cada 6 horas.	Todas las vías
Fosfato de codeína	Es un opioide para la analgesia, tos y a veces, diarrea en perros y felinos.	Hace que el centro de la tos en el bulbo se deprime hasta el punto de ser poco receptivo a los estímulos	Caninos: o Antitusivo: 1–2 mg/Kg cada 6 - 12 horas. Se puede necesitar el aumento de la dosis para lograr eficacia satisfactoria como analgésico: 0,5 – 2 mg/Kg cada 6 – 12 horas para dolor agudo leve a moderado. Felinos: No se utiliza este producto en combinación con cetaminofeno o como analgésico: 0,5 – 2 mg/Kg cada 6 – 8 horas para dolor agudo leve a moderado.	Vía subcutánea y vía oral
Bromhidrato de dextrometorfano	Se usa para aliviar temporalmente la tos causada por el resfriado común, la gripe y otras afecciones.	Pertenece a una clase de medicamentos llamados antitusivos.	Perro: 1-2 mg/Kg de peso, 3-4 veces al día. Gato: 2 mg/Kg IV.	Vía oral
Guaifenesina	Es un derivado del alquitrán de madera que disminuye la adhesividad del moco contra las paredes del tracto respiratorio	Utilizado como expectorante	100-200 mg cada 6 horas.	Vía oral
Prednisolona	Es una Combinación De antihistamínico fenotiacínico y corticosteroide	Es empleado como antitusivo.	En general, y para todas las especies se utiliza por todas las vías a razón de 1,1 – 4,4 mg/Kg cada 6 horas.	Todas las vías
Butopirina	-	Facilita la expectoración, es un fluidificante bronquial y antitusivo.	En perros con peso entre 210-12 Kg, la dosis es de 0,02 g. en comprimidos que se administran 1-3 veces al día.	Vía oral