

Manobras obstétricas

- **Mutación:** es la manipulación necesaria para corregir la presentación, posición y ~~esta~~ actitud del feto que se presentan de manera anormal estorbando la evolución fisiológica del mismo. Para hacer la mutación es necesario que haya espacio dentro del útero.
- **Tracción forzada:** esta indicada cuando hay un distorsión en el parto o en el feto es grande, cuando el canal obstétrico permite el paso con tracción o cuando han disminuido las contracciones en fuerza e intensidad.
- **Episiotomía:** se utiliza como medida preventiva para evitar o reducir al mínimo el desgarro inevitable de la vulva y el perineo. Está indicada principalmente en primíparas donde la dilatación está consuada por dilatación incompleta de la vulva o la cabeza del bebé es muy grande.

También se usa cuando hay una ruptura de bolsa fetal o en actitudes anormales del feto vivo. De no llevarse a cabo la episiotomía se corre el riesgo de que las laceraciones se desgarren.

Fetotomía: Comprende todas las intervenciones quirúrgicas encaminadas a disminuir el volumen del feto dentro del cuerpo de la madre, realizando secciones para facilitar su extracción.

Se efectúa en casos de estrechez pélvica o volumen excesivo de la cría, y en general cuando ya está murta.

Se divide en peritel cuando la dificultad se puede resolver solo amputando determinados parte del cuerpo, o fetal cuando el cuerpo es tan voluminoso debido a alguna alteración ~~patológica~~ patológica. En este caso, cuando hay pocas probabilidades de éxito, es posible que el sacrificio de la madre sea necesario.

Cesáreas esta puede ser preferible a la fetotomía en casos de debilidad general y distocia prolongada, aun incluso cuando la cría está murta.

Las indicaciones incluyen tamaño excesivo del feto, inmadurez de la hembra, estrechez relativa o absoluta del canal pélvico o en programas reproductivos de animales salvajes para reducir riesgos.

Algunas de las contraindicaciones para realizar la cesárea van desde una mala condición corporal de la madre, que el feto sea infectado, que haya presencia de infecciones generalizadas en la madre, y que haya ruptura o perforación del feto.