

ALUMNA: LISEIDY AYSLETH DOMINGUEZ DIAZ
MATERIA: ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES
UNIVERSIDAD DEL SURESTE
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA



CLASIFICACION DE LAS RAZAS DE PERROS

Actualmente, la FCI cuenta con un total de 91 países miembros y socios contratantes, encargados de formar a sus propios jueces para cursar ellos mismos los pedigríes de su país, puesto que la FCI no los emite. Por otro lado, la Federación Cinológica Internacional reconoce 343 razas, todas ellas clasificadas en 10 grupos distintos. Además de las razas definitivas, la organización agrupa en una categoría aparte todas aquellas que ha admitido de forma provisional.

Por lo tanto, solo mencionaremos algunos grupos.

Perros de pastor

Perros boyeros

Perros tipo pinscher y schnauzer

Molosoides

Perros tipo montaña y boyeros suizos

Perros terriers de talla grande y media

Perros terriers de talla pequeña

Perros terriers de tipo bull

Perros terriers de compañía

Perros nórdicos de trineo

Chihuahueño

Perros tipo sabueso

TIPO DE DENTICIÓN, FÓRMULA DE DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES EN LOS PERROS Y GATOS.

los cachorros nacen sin dientes. Los primeros dientes de leche aparecen de forma gradual, a partir de las tres semanas de edad para ser sustituidos más tarde para los dientes definitivos. Los dientes de leche en perro son veintiocho, cuando ya son las definitivos son cuarenta y dos. Los dientes se clasifican en incisivos, caninos, premolares y molares.

LA FÓRMULA DENTÁRIA ES LA SIGUIENTE:

- Dientes de leche: $2x(Di\ 3/3\ Dc\ 1/1\ Dp\ 3/3) = 28$ (Di..... incisivos Mie..... caninas Dp-- premolares)
- Dientes definitivos: $2x(Y\ 3/3\ C\ 1/1\ P\ 4/4\ M\ 2/3) = 42$ (I....incisivos C....caninos P....premolares M...molares)

La determinación de la edad de cachorro tanto sea perro o gato, se puede establecer de forma aproximada según la erupción de los dientes permanentes.

Perro: incisivo central (tres meses de edad), incisivos medios (cuatro meses de edad), laterales (cinco meses de edad), caninos y premolares (de cuatro a seis meses de edad) y molares (de cinco a siete meses de edad). Puede existir variaciones según la raza.

- Gato: incisivos (de tres a cuatro meses de edad), caninos y molares (de cuatro a cinco meses de edad) y premolares (de cuatro a seis meses de edad).

NUTRICIÓN EN LOS CARNÍVOROS.

ingesta de carne, ya sea depredando a otros animales o comiendo carroña.

no todos los animales carnívoros son cazadores o depredadores, ya que algunos carnívoros son carroñeros.

Dependiendo del tipo de animales y del tipo de tejido que comen, los carnívoros.

cuenta con un aparato digestivo preparado para la digestión de la carne. Muchos de ellos tienen dientes para desgarrar a sus presas, aunque hay carnívoros sin piezas dentarias (como los pingüinos emperadores).

se alimentan a base de carne ya sea por depredación o consumo de carroña. A pesar de que existen muchas especies de animales carnívoros, algunas subespecies no son consumidoras exclusivas de carne. Por ejemplo, el tigre, el león.

