



**UNIVERSIDAD DEL SUR**

**MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 7° CUATRIMESTRE  
(ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES)**

**PROFESOR**

**GILBERTO ERWIN HERNANDEZ PEREZ**

**ALUMNO**

**MARCO DE JESUS MORALES GARCIA**

**Actividad**

**PRINCIPALES ZONOSIS DE LOS PRROS**

## Tipos de zoonosis

La borrellosis es causada por garrapatas. Sus principales síntomas son la dermatosis inflamatoria, la fiebre, el dolor muscular, articular y de cabeza, los vómitos y la inflamación de los ganglios linfáticos.

La pasteurelosis se puede originar por la transmisión de una bacteria a través de la mordedura de perros y gatos, cuya herida puede infectarse.

La salmonelosis se puede contagiar a los hombres a través de perros o alimentos infectados.

La campilobacteriosis es una enfermedad provocada por una bacteria en perros, cobayas y gatos. Puede contagiarse al hombre por contacto con animales enfermos, y pueden provocar malestar general, diarrea y vómitos, entre otros síntomas.

La leptospirosis canina es una infección que se da en perros y que tiene por origen el contacto con agua contaminada por orina de animales ya enfermos. Produce problemas en el hígado y los riñones de los perros.

El parvovirus es una enfermedad propia de los perros, que no se transmite a los hombres. Se produce cuando los animales están en contacto con las heces de perros ya infectados. Ataca sobre todo a los cachorros y les provoca

gastroenteritis, fiebre y decaimiento general. Una de sus características es que dura por mucho tiempo, ya que es resistente incluso en los climas más extremos. La vacunación es la mejor manera de prevenir esta enfermedad.

La hidatidosis es otra patología que puede transmitirse a los humanos. El animal se contagia a través de comer achuras crudas con los quistes típicos de esta enfermedad.

Los huevos del parásito pueden contagiarse muy fácilmente. Hay que destacar que el perro no sufre la enfermedad, solamente la transmite. Por eso, en la mayoría de ocasiones los dueños del can pueden no ser conscientes de que su mascota tiene esta patología. La prevención es esencial en estos casos, ya sea a través de la desparasitación como de la eliminación de la carne cruda de su dieta.

Los ácaros pueden provocar sarna en el perro y Cheyletieliasis en los gatos. Cuando se transmite a las personas, causa picores y diversas lesiones en la piel.