



Alumno: Emmanuel Rodas Ángel

Materia: Fisiología de la reproducción II

Cuadro sinóptico: Tricomoniasis

Carrera: M.V.Z.

Tricomoniasis

Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común causada por la infección transmitida por el parásito protozoario llamado *Trichomonas vaginalis*.

Tratamiento

Se puede curar con una sola dosis de un antibiótico recetado (puede ser metronidazol o tinidazol), en pastillas que se pueden tomar por la boca. El tratamiento consiste en que ambos miembros de la pareja tomen una dosis elevada de un determinado antibiótico oral.

Sintomas

Cuando la tricomoniasis causa síntomas, pueden variar entre irritación leve e inflamación grave. Algunas personas presentan los síntomas durante los 5 a 28 días después de haberse infectado, pero otras los presentan mucho más tarde. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer.

Mujeres

Pueden notar picazón, ardor, enrojecimiento o dolor en los genitales, molestia al orinar, o una secreción clara con un olor inusual que puede ser transparente, blanca, amarillenta o verdosa.

Hombres

Pueden sentir picazón o irritación dentro del pene, ardor después de orinar o eyacular, o pueden tener alguna secreción del pene.

¿Cómo se puede contagiar?

Una persona infectada puede transmitirle el parásito a otra persona que no tenga la infección durante las relaciones sexuales.

