



“Universidad del Sureste”

Turno matutino.

Zootecnia en pequeñas especies.

“Manejo reproductivo.”

Presenta:

Yadira Barrios López.

Séptimo Cuatrimestre ‘U’.

Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Catedrático:

MVZ. Francisco David Vázquez
Morales

Domingo 18 de octubre de 2020

Tapachula, Chiapas, México.

Manejo reproductivo

Reproducir perro apropiadamente significa planear en forma adecuada los cruces en función de la edad, salud, temperamento y calidad. Asimismo, la reproducción demanda mucho tiempo, dedicación y dinero.

Consideraciones

- Calidad.
- Tiempo.
- Costos.
- Ingresos.

Cruzamientos

- Inbreeding (Consanguinidad estrecha).
- Linebreeding (consanguinidad abierta o en línea).
- Crossbreeding (Vigor híbrido).

Registro

- Registro del macho reproductor.
- Registro de madres.
- Registro reproductivo de la madre.
- Registro de conducción de camada.
- Registro individual de cachorros.

Falsa preñez

Es una anomalía en que la perra presenta síntomas de estar preñada, sin estarlo. Es muy común en perras impresionables o nerviosas. No es necesario aparear a la hembra para que aparezca la preñez falsa.

Herencia

La reproducción sexual combina la información genética de dos animales diferentes. La hembra pasa su información a través del óvulo y el macho a través del espermatozoide. El sexo del cachorro dependerá del tipo de cromosomas que aporte la madre (XX) y el padre (XY).

Apareamiento

Se puede aparear un macho después de un año de edad y una hembra a partir del segundo periodo de celo. Se debe hacer en el alojamiento del macho, pues estos se portan mejor cuando están en ambiente conocido.

Gestación

Una vez preñada, la perra va a gestar durante aproximadamente 9 a 10 semanas. La duración puede verse influenciada por la raza y el número de fetos (una camada numerosa, suele acortar la gestación).

Parto

No es necesario atender a la perra a menos que tenga alguna dificultad, hay que permanecer a su lado durante el parto, dispuesto a ayudarla si es necesario. Durante las contracciones, la perra jadeará, se moverá en la caja de parto o quizá saldrá de ella para tomar agua. Todo eso es normal.