



LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

NUTRICIÓN EN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

CUADRO COMPARATIVO → CIRUGÍAS GASTROINTESTINALES

DOCENTE: LAURA BLASI PINEDA

ALUMNA: XOCHITL PÉREZ PASCUAL

CUARTO CUATRIMESTRE

GRUPO "A"

TAPACHULA CHIAPAS

09/10/2020

Cuadro comparativo de cirugías GI.

CIRUGÍA	DESCRIPCIÓN	ÓRGANO INVOLUCRADO	ALIMENTOS
GRASTRECTOMÍA PARCIAL	Supone eliminar el antro (secretor de gastrina), hasta un 75% del estómago distal. En el procedimiento, el estómago restante se puede unir nuevamente al duodeno (Billroth I) o a un lateral del yeyuno (Billroth II).	Estómago	Permitidos: queso seco, pescados blancos, agua, huevo duro o pasado por agua, yogur natural, aceite de oliva o girasol, jamón cocido, carne sin grasa, fruta hervida o al horno, arroz. Con moderación: jugo de frutas, queso fresco, yogur de frutas, carne con grasa, frituras, pan, leguminosas. Evitar: refresco con gas, leche entera, cereales integrales, pescado azul, azúcar, alcohol, mariscos.
GASTRECTOMÍA TOTAL	Se realiza En las neoplasias malignas que afectan a la porción media o superior del estómago	Estómago	
VAGOTOMÍA TRONCAL	Sección completa del nervio vago sobre el esófago distal) reduce la secreción ácida de las células parietales gástricas y disminuye su respuesta a la gastrina, pero también altera el vaciado gástrico.	Nervio vago sobre el esófago distal	
VAGOTOMÍA PARCIAL O SELECTIVA	Divide y secciona únicamente las ramas del nervio vago que inervan el estómago proximal, donde tiene lugar la secreción de ácido gástrico, mientras que el antro y el píloro siguen estando inervados y el vaciado gástrico se realiza con más normalidad.	Nervio vago del estómago proximal	
ANTRECTOMÍA	Extirpación de la parte pilórica del estómago.	Estómago	
COLOSTOMÍA	Si solo se extirpan recto y ano, la colostomía es la puerta de entrada al colon.	colon	Ingesta adecuada en líquidos.
ILEOSTOMÍA	Se realiza cuando es necesario reseca todo el colon, recto y ano.	Colon	
COLECTOMÍA	Extirpación quirúrgica de parte o de todo el colon. Se lleva a cabo para tratar el cáncer de colon o la colitis ulcerosa crónica grave.	Colon	