



**Nombre del alumno: Juan Bernardo
Hernández López**

**Nombre del profesor: Prado Hernández
Ezri Natael**

**Nombre del trabajo: Cuadro
comparativo**

Materia: Biología del Desarrollo

Grado: 1 Semestre Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 06 de noviembre | 2020

Cuadro Comparativo de hernias

Hernia de Bochdalek	Hernia de Morgagni
Es una patología congénita que se origina entre la semana 8 y 10 de la vida fetal intrauterina.	Hernia congénita por un defecto de la fusión de las partes central y lateral del diafragma, que de un modo queda un defecto diafragmático
Es la más frecuente, su incidencia es de 1/2200 RN vivos	Forma menos frecuente
Se debe a un cierre incompleto de alguna de las porciones laterales y posteriores del diafragma con la pared costal, lo que ocurre más tardíamente a izquierda, la frecuencia a este lado es de 85%, 10% a derecha y 2% bilateral	Se debe a un defecto de la formación del septum transversum que forma la porción anterior del diafragma, más frecuente a derecha, debido a que el lado izquierdo son ocupados por el corazón y el pericardio, puede contener asas intestinales, epiploon e hígado.
En el RN puede representar una emergencia médica, si no es diagnosticado y tratado oportunamente	Habitualmente no se presenta como una emergencia médica, diagnosticándose en niños mayores o adultos
El tratamiento es quirúrgico, si no se interviene la mortalidad puede ser del 100%, aún operados la mortalidad es de 30% debido a la hipoplasia e hipertensión pulmonar.	Es fundamental el tratamiento precoz. El tratamiento quirúrgico presenta buen pronóstico ya sea por la parotomía o mediante vía laparoscópica

