



RESTRICCION DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO

es

Disminucion patologica de crecimineto fetal

Mortalidad

Hipoxia Trasparto

Alteraciones Metabolicas

Hipoxia Cronica

Lesion Nurologica

Clasificacion

Segun el momento de instauracion

Precoz

es

mas de 28 semanas

Tardio

es

menos de 28 semanas

Etiopatogenia

Se divide

Materna

Habitos Nocivos

Fetal

Anomalias Cromosomicas
Malformaciones Congenitas

Uroplacentaria

Anomalias Morfologicas
Anomalias en el cordon

Diagnostico

Anamnesis:
Facror de Riesgo
o Antecedentes

Antropometria
Materna:
Talla y Peso

Altura Uterina:
Despues de
la semana 26

Pronostico

Desfavorable

Malformacion Fetal
50% de complicacion
perinatal

Postnatal

Reduccion del
crecimiento
y peso

Profilaxis

Pre- gestacion

Mejorar Condiciones:
Fisicas y nutri-
cionales

Gestacion

Diagnostico
Temprano
Farmacos
para la
preservar
la perfusion
uterina

Segun porciones corporales fetales

Clasificacion:

Simetrico Cronico Tipo I
20-30% hereditario o cromopatas,
embriopatas
infecciosas o toxicas

en

Asimetrico Subagudo Tipo II
70-80% insuficiencia vascular
uteroplacentaria

Tambien

Combinado
5-10%