



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

Biología del Desarrollo

Cuadro comparativo

“Hernia de Bochdalek y Hernia de Magagni”

Dr. Natanael Ezri Prado.

Presenta. Mauricio Agustín Rodríguez Ortiz

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 06/11/2020.

Cuadro comparativo Hernia de Bochdalek y Hernia de Morgagni

Hernia de Bochdalek

Ocurre en la zona posterior.

Puede producir Hipolesio Almenar.

En radiografías, aparece como una

lesión de opacidad de los tejidos

blandos, de la base del pulmón

vista posteriormente en los ángulos

laterales,

que sintomas como el dolor

abdominal, dolor en el pecho,

Respiración dificultosa, indigestión,

bloques intestinales.

Normalmente aparece a la derecha,

Hernia de Morgagni

Ocurre en la zona anterior.

Es asintomática.

En radiografías, aparece como

una masa o la presencia de

líquidos en el ángulo cardíaco

frontero retrosternal $1/4$ en

el ángulo paraesplénico.

Normalmente aparece a la

izquierda.

Puede presentar síntomas

como disnea, distensión

intestinal aguda y abdominal

aguda por vólvulo gástrico.