



**Nombre del alumno: Juan Bernardo
Hernández López**

**Nombre del profesor: Prado Hernández
Ezri Natael**

**Nombre del trabajo: Mapa sobre el
aborto y anomalías de la placenta**

Materia: Biología del desarrollo

Grado: Primer semestre Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de octubre del 2020

ABORTO

Interrupción prematura y definitiva del desarrollo de un cigoto y expulsión fuera del útero, o bien expulsión de un embrión o un feto antes de que sean variables, es decir capaces de sobrevivir fuera del útero

TIPOS

Aborto completo es un aborto en el cual todo el feto y la placenta han salido del útero antes de la semana 20 del embarazo

Aborto inevitable, es aquello que por sus condiciones clínicas no puede seguir con la gestación y esta condiciona que el feto se pierda.

EJEMPLO:

- Ruptura de la bolsa amniótica
- Perdida del latido fetal

Aborto en evolución presencia hemorrágica genital, persistente, actividad uterina reconocible clínicamente y modificaciones cervicales

Se sabrá por medio de un ultrasonido, si se encuentra componentes fetales habrá que hacer un legrado uterino para que no queden restos placentarios

Aborto diferido que se presenta cuando ha ocurrido la muerte del producto de la concepción, no se expulsa en forma espontánea.

Aborto incompleto, cuando se expulsa el producto de la gestación sin la totalidad de sus componentes fetales.

Amenaza de aborto, es la presencia hemorrágica genital o contabilidad uterina sin modificaciones cervicales.

Aborto ceptico es cuando cualquiera de las variedades anteriores a las que se agrega infección intrauterina o pélvica

Anomalías de la placenta

Ocurre durante el embarazo, por posibles problemas de placenta, incluyen desprendimiento placentario, previa y placenta adherida.

Estos trastornos pueden causar un posible sangrado vaginal abundante

Placenta Bipartida o Bilobulada:

Está dividida en 2 lóbulos separados pero unidos entre sí por los vasos primarios y por las membranas, este tipo es una variedad extraña, la retención de un lóbulo luego del parto podría producir complicaciones hemorrágicas y de infecciones .

Placenta previa:

Ocurre cuando la placenta del bebe obstruye de manera total o parcial en el cuello uterino de la madre (En la salida).

Puede provocar un sangrado grave durante el embarazo y el parto

La placenta succenturia:

Animalia morfológica de la placenta donde se presentan uno o más lóbulos accesorios por fuera del cuerpo placentario (diferentes tamaños)

Marginal:

La placenta está al lado del cuello uterino, pero no cubre

Parcial:

Cubre parte de la abertura cervical.

Completa:

Cubre toda la abertura cervical