
Cardiopatias congenitas
Tipos
como
son
Cianotica
Tetralogía de Fallot
es una combinación
de cuatro anomalías congénitas.
Los cuatro defectos incluyen
una comunicación interventricular (CIV)
, una estenosis de la válvula pulmonar,
una dextraposición de la aorta
y un engrosamiento
de la pared ventricular derecha
(hipertrofia ventricular derecha)
Transposición de los grandes vasos
ocurre al momento
del nacimiento (congénito),
donde se revierten (transponen)
las dos arterias principales que salen del corazón
Atresia tricúspide
la válvula que controla
el flujo de sangre desde
la cavidad superior derecha hacia l
a cavidad inferior derecha
del corazón nunca se forma.
Tronco arterial
curre cuando el vaso sanguíneo
que sale del corazón del bebé
en gestación no se separa completamente
durante el crecimiento
y deja conectadas a la aorta
y la arteria pulmonar.
Corazón izquierdo hipoplásico
cuando partes del lado izquierdo del corazón
(válvula mitral, válvula aórtica,
ventrículo izquierdo y aorta)
no se desarrollan por completo.
afección es congénita (está presente al nacer)
Atresia pulmonar
por el cual la válvula que controla
el flujo de sangre desde
el corazón hacia los pulmones nunca
se forma. En los bebés con
este defecto, la sangre tiene problemas
para fluir hacia los pulmones
para incorporar el oxígeno que debe llevar a todo el cuerpo
Anomalía de Ebstein
es un defecto cardiaco inusual en el cual
la válvula tricúspide, válvula entre la cavidad
superior derecha (aurícula derecha)
y la cavidad inferior derecha
(ventrículo derecho) del corazón, no se forma de manera correcta
No cianogenas
????
Comunicación interventricular (CIV)
es un defecto de nacimiento en el corazón,
en el cual hay un orificio en la pared
(septo o tabique) que separa las
dos cavidades (ventrículos)
inferiores del corazón.
Esta pared también se llama septo ventricular
Comunicación interauricular
hay un orificio en la pared (septo o tabique)
que separa las cavidades s
uperiores del corazón (aurículas).
El orificio puede ser de
distintos tamaños y puede cerrarse
por sí solo o requerir cirugía
Conducto arterial persistente
que se produce cuando el
canal normal situado
entre la arteria pulmonar y
la aorta en el feto no se cierra al nacer.
Estenosis aórtica
ocurre cuando la válvula aórtica no se
abre adecuadamente, impidiendo que
una parte de la sangre del ventrículo izquierdo pase al resto.
Estenosis pulmonar
es un trastorno en el que una deformación
en la válvula pulmonar o
cerca de esta reduce la abertura
de esta válvula y disminuye el flujo sanguíneo