



## MEDICINA HUMANA

Nombre de alumno: Jhonatan Sanchez Chanona

Doctor: Natanael Ezri Prado Hernández

Nombre del trabajo: CUADRO COMPARATIVO SOBRE HERNIA DE BOCHDALEK Y MORGAGNI

Materia: Biología del desarrollo

Grado: 1

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 05 de Noviembre de 2020

# CUADRO COMPARATIVO DE HERNIA:

## HERNIA BOCHDALECK

Es la más frecuente

Se debe a un cierre incompleto de alguna de las porciones laterales y posteriores del diafragma.

Es un predominante posterior, predominio izquierdo.

Procesos graves

Representa aproximadamente el 80 a 90% de la totalidad de los casos

El intestino queda atrapado en la cavidad torácica cuando se forma el diafragma

## HERNIA DE MORGAGNI

Es la forma menos frecuente

Se debe a un defecto de la formación del septum transverso que forma la porción anterior del diafragma.

Es un predominante anterior, predominio derecho.

Procesos leves tardíos

Representa el 2% de la totalidad de los casos

El tendón que debe desarrollarse en la mitad del diafragma no se forma correctamente

## SIGNO DE HALO

Primer signo clínico radiológico de muerte temprana fetal

Radiolúcido del cráneo fetal debido a la separación del pániculo adiposo pericraneal y cuero cabelludo que ocurre 2 a 4 días después de la muerte fetal

## SIGNO DE SPALDING

Tiene que tener una semana de muerto el feto

El cabalgamiento de los huesos del cráneo que ocurre entre 2 y 14 días después de la muerte fetal

El aplastamiento de la bóveda