



**Nombre del alumno: Brissa Del Mar
Antonio Santos**

**Nombre del profesor: Sergio Jiménez
Ruíz**

Nombre del trabajo: Reporte

Materia: Interculturalidad y salud I

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 1 "B"

Niveles de atención, se define como una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, estas no pueden verse en términos de servicios prestados, sino en el de los problemas de salud que se resuelven.

Hay 3 niveles de atención

Primer nivel: Es aquel que se encuentra más cercano a la población. Está dado en consecuencia como la organización de los recursos que les permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción y prevención y procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros de salud etc. Se resolverán el 85% de los problemas prevalentes.

Segundo nivel: Se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, cirugía etc. Se resuelven hasta el 95% de problemas de salud.

Tercer nivel de atención. Se reserva para problemas poco frecuentes, se requieren tratamientos especializados y de alta tecnología.

Sistema de referencia y contraferencia

Para que el proceso de atención a los usuarios se pueda dar por parte del sistema sanitario, los niveles de atención deben de funcionar con una adecuada referencia y contrarreferencia y para esto es fundamental la coordinación entre los diferentes niveles.

La referencia es un procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutoria.

La contrarreferencia es el procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de referencia, una vez resuelto el programa de salud, devuelve la salud responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o el resultado de una prueba diagnóstica.

Niveles de complejidad

Se entiende como complejidad al número de tareas diferenciadas o procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y el grado de desarrollo alcanzado por ella. El primer nivel de complejidad se refiere a policlínicas, centros de salud, consultorios etc. En el segundo nivel de complejidad se refiere a policlínicas se ubicaría al igual que en el nivel de atención a los hospitales con especialidades como medicina interna, pediatría etc. El tercer nivel de complejidad se refiere a establecimientos que realizan las prestaciones médicas y quirúrgicas con presencia de subespecialidades las cuales se caracterizan uso intensivo de equipamiento,



Niveles de prevención

Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.

Existen 3 niveles

Prevención primaria

Medidas orientadas para evitar la prevención. Son estrategias de promoción y prevención de salud para así lograr evitar la aparición de la enfermedad mediante estrategias como prácticas de prevención hacia alguna enfermedad, como el VIH.

Prevención secundaria

La prevención secundaria es el diagnóstico temprano y oportuno, del tratamiento adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad.

La captación temprana de los casos y control periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas es fundamental.

Prevención terciaria

Son acciones relativas a la recuperación de la enfermedad, clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este modo las mismas.

Referencias

Julio, D. V. (05 de 2011). *SciELO*. Obtenido de

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003