



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Presentan

José Lenin Quiñones López

Docente:

Romeo Suarez Martínez

7° semestre, grupo "B"

Materia:

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Comitán de Domínguez, Chiapas, 24/11/2020

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

MÉTODOS	BENEFICIOS	VENTAJAS	DESVENTAJAS	PRESENTACIÓN	DOSIS
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES					
Anticonceptivos orales	Reduce el riesgo de cáncer ovárico Reduce el riesgo de enfermedades mamarias benignas Reduce el riesgo de embarazo ectópico Reduce el riesgo de anemia Disminuye dolor en menstruación	Seguros y controlados por la paciente Reversible Bajas complicaciones 99% de eficacia	No son tan eficaces en el uso típico Toma diaria No protege contra ITS Efectos secundarios son comunes	Con estrógeno y progestina AO que solo contienen progestina. Combinados	Baja: 30 y 35 mcg o entre 0,030 y 0,035 mg Alta: 50 mcg o 0,05 mg
Píldoras anticonceptivas de emergencia (pae)		Más eficaces que los AOC Más eficacias mientras se empiezan más tempranos	Más común las náuseas y vómitos La menstruación puede presentarse una semana antes o después No protege contra ITS	píldoras sólo de progestina o de anticonceptivos orales combinados	Cada dosis debe contener 0,75mg
Anticonceptivos inyectables	Los inyectables contienen hormonas femeninas que se inyectan profundamente en el músculo y se liberan gradualmente en el torrente sanguíneo; de	Los inyectables son seguros y se encuentran entre los métodos anticonceptivos más eficaces. Las tasas típicas anuales de embarazo	Los efectos no son inmediatos. Retraso en el entorno a la fertilidad. No protege contra ITS	inyectables sólo de progestina, que contienen una forma sintética de la hormona femenina progesterona inyectables combinados (o AIC),	Enantato de noretisterona (o NET-EN) 200 mg c/2 meses. Acetato de medroxiprogesterona de depósito (o DMPA) 150 mg/3 meses

	este modo, proporcionan anticoncepción por largo tiempo.	son del 0,4 por ciento o menos.		que contienen progestina y estrógeno.	
Implantes subdérmicos	se implantan y que durante cinco años liberan continuamente en el torrente sanguíneo dosis bajas de la progestina levonorgestrel	Seguro y eficaz Efecto prolongado pero reversible Pueden usarlo las mujeres que amamantan.	No se puede usar ni discontinuar sin ayuda de un proveedor. No protege contra las ITS Se requiere un procedimiento quirurgico menor para insertarlo y extraerlo.	progestina levonorgestrel.	Seis cápsulas
Sistemas intrauterinos liberadores de hormonas		eficaz durante un año y durante cinco años dependiendo la presentación que se utilice. Reduce la cantidad de sangrado menstrual	No protege contra las ITS. se insertan en el útero. Sangrado menstrual irregular	sistema liberador de levonorgestrel o sistema intrauterino de levonorgestrel (SIU de LNG). sistema liberador de progesterona.	1 siu

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS NO HORMONALES

Condón masculino de látex	Ampliamente disponibles	Eficaz contra el embarazo si se usa en forma correcta y sistémica. Protege contra la ITS, incluyendo el VIH	Menos eficacia en el uso típico Se requiere cooperación del compañero. Se daña si se expone a base de lubricantes aceites, calor, humedad o luz.		1pz
Condón femenino		no tiene efectos secundarios. Eficaz cuando se usa	Menos eficaz en el uso típico. Baja comercializacio		1pz

		correcta y sistemáticamente. Puede proteger los genitales externos Protege contra la ITS, incluyendo el VIH	n debido a su poco uso		
Diafragma y capuchón cervicouterino		Reusables Disminución del riesgo de algunas ITS cuando se usan con espermicidas	Se insertan en la vagina Un proveedor capacitado debe determinar el tamaño adecuado Puede causar irritación		1pz
Espermicidas	Mucho más eficaces que otros métodos modernos	Reusables Disminución del riesgo de algunas ITS cuando se usan con espermicidas	Menos eficaces si se utilizan solos. Se insertan en la vagina Un proveedor capacitado debe determinar el tamaño adecuado	Láminas, tabletas espumantes, supositorios o gels	
DIU	eficacia dura hasta 10 años.	Mas seguro y sumamente eficaz. Tienen efecto prolongado y es reversible. No se necesita hacer nada durante el acto sexual. Pueden usarlo las mujeres que amamantan.	Calambre y sangrado abundante. Se requiere de proveedor capacitado para ponerlo y quitarlo. No ofrece protección contra ITS y VIH	Espiral de cobre en el tallo vertical de la "T"	1pz

		No tiene efecto secundario sistemicos			
Esterilización femenina y masculina	Protege contra el cáncer ovárico. Protege contra EPI No afecta la función sexual.	Es muy segura y sumamente eficaz. Es permanente. No se necesita hacer nada durante el acto sexual. Pocos efectos secundarios	Costo inicial alto. Reversibilidad limitada. Se requiere de intervención quirúrgica. No ofrece protección contra ITS ni VIH		
Coito interrumpido		No hay gastos económicos Misma efectividad que los métodos de barrera	Requiere disciplina y control de si mismos No ofrece protección contra ITS ni VIH		