



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

“MAPA CONCEPTUALES”

Janeth Araceli Álvarez Gordillo

CLÍNICAS GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Semestre: 7°

Grupo: “A”

Dr. SUAREZ MARTÍNEZ ROMEO

Comitán de Domínguez, Chiapas Noviembre del 2020.

INFECCIONES CERVICOVAGINAL

Candidiasis vulvovaginal

etiología

c. albicans
90%

Manifestaciones

-Prurito
-Dolor
-Dispareunia
-Leucorrea De Aspecto Grumoso

manifestaciones

-Disuria
-Dolor Hipogástrico
-Leucorrea Amarilla
-Prurito

tratamiento

-Azitromicina 1g VO Dosis Única
-Doxiciclina 100mg VO 2 Veces Al Dia X7 Dias

Chlamydia Trachomatis

Definición

Inflamación de la mucosa vaginal, cuya causa generalmente se debe a infecciones por hongos, bacterias y protozoarios

Vaginosis bacteriana

Etiología

Gardenerella vaginalis

manifestaciones

Leucorrea mal oliente olor a pescado

tratamiento

Elección: Metronidazol 500mg VO c/d 12 x 7 días

Tricomoniasis

Etiología

Trichomona vaginalis

manifestaciones

-Leucorrea maloliente
-Disuria
-Dolor pélvico

tratamiento

Elección: Metronidazol 500mg VO c/d 12 x 7 días

-Miconazol crema 2%

ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

Síndrome clínico que abarca procesos inflamatorios del tracto genital superior en la mujer

Definición

-Dolor Abdominal
-Leucorrea
-Sangrado Irregular

Manifestaciones

Etiología


- Neisseria Gonorrhoeae
- Chlamydia trachomatis

Factores de riesgo


-Mujeres en edad reproductiva < 30 años
-Duchas vaginales
-Uso de DIU
-ETS

Tratamiento

-Levofloxacino 500mg VO c/24 x14 dias
-metronidazol 500mg VO c/12 x 14 dias



HEMORRAGIA PUERPERAL



Clínico

Diagnostico

Tratamiento

Definición

-Fluido Terapia
-Oxitocina 20U En 500ml SG
-Ergometrina 0.2 A 0.5 Mg
-Misoprostol 800 Mcg
-Compresión Bimanual

Pérdida de sangre del tracto genital después del parto fetal >500ml o >1000 después de una cesárea

Manifestaciones

HEMORRAGIA PUERPERAL

Clasificación

Etiología

-Inercia Uterina
-Restos Placentarios
-Placentación Anormal
-Rotura Uterina
-Inversión Uterina
-Coagulopatias

-Sangrado Por Vía Vaginal
-Hipotensión
-Taquicardia
-Oliguria
-Taquipnea
-Palidez
-Útero Con Desgarro En El Canal De Parto
-Abdomen Agudo
-Alteración De

Primaria

Secundaria

Ocurre dentro de las primeras 24hrs

Ocurre entre las 24hrs y las 6 semanas postparto

