Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Mapas de 4 unidad

Gómez Vázquez Juan Carlos

Ginecología y obstetricia

7º “A”

Comitán de Domínguez, Chiapas; a 15/enero/2021

ENDOMETRIOSIS

definicion

presencia de tejido endometrial funcionel, glandular y estroma fuera de la cavidad uterina, principalmente en ovarios y en la superficie del peritones pelvico.

pruebas diagnosticas

evaluacion histologicas de las lesiones
se recomienda laparoscopia
ultrasonografia vaginal
resonancia magnetica
marcadores sericos: Ca 125

diagnostico

dolor pelvico cronico
infertilidad
masa anexial
dismenorrea
hipermenorrea
dispareunia

tratamiento

Tx farmacologico:

antiinflamatorios no esteroideos (AINE)
la supresion de la funcion ovarica por 6 meses reduce el color asociado a la endometriosis

anticonceptivos orales
danazol
gestrinona
acetato de medroxiprogesterona

MIOMATOSIS

definicion

Tumores benignos del musculo liso del utero, ocasionalmente malignizan.
Son dependientes de estrogenos y progesterona, generalmente tienen regresion en la menopausia.

factores de riesgo

edad : desde los 20 a 70 (35 a 45)
raza: afroamericaca
sexo: mujeres
nuliparidad
obesidad y sobrepeso
menarca temprana
menopausia tardia
tumores ovaricos productores de estrogenos

pruebas diagnosticas

Ultrasonido abdominal o transvaginal
histeroscopia es un metodo axuliar para diagnosticar (polipos o miomas submucosos)
resonancia magnetica
pasientes >35 años realizar biopsia endometrial.

diagnostico

50% son asintomaticos
hemorragia uterina anormal21.4%
tacto bimanual (recto-vagina) tiene una alta sensibilidad cuando el mioma mide mas de 5 cm.

tratamiento

Tx farmacologico:

analogos de la hormina liberadora de gonadotropinas
medroxiprogesterona
AINES

Tx quirurgico:

miomectomia procedimiento que se realiza en las pacientes que desean concervar el utero o con paridad insatisfecha.

la laparotomia por via abdomina ha mostrado ser la tecnica de eleccion.

CANCER DE MAMA

definicion

crecimiento anormal y desordenado de las celulas del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios.

pruebas diagnosticas

estudios de imagen (mastogafia, ultrasonido mamario)
resonancia magnetica
biometria hematica
tiempos de cuagulacion
quimica sanguinea
pruebas de funcionamiento hepatico
fosfatasa alcalina
receptores estrogenicos y progestacionales.

diagnostico

las pacientes deberan someterse a un estudio de imagen seguido de biopsia por aspiracion o biopsia con aguja de corte.

lesion maligna, debera tener una confirmacion histopatologica antes de cualquier procedimiento quirurgico definitivo.

tratamiento

Tx no farmacologico:

en el cancinoma ductal in situ (CDIS) la primera opcion es escision completa del tumor mas radioterapia

segunda opcion es la mastectomia con o sin reconstruccion

tercera opcion escision sola seguida solo por observacion.

Tx farmacologico:

quimioterapia abyuvante postoperatoria

CANCER ENDOMETRIAL

definicion

neoplasia glandular maligna que se origina en la capa interna del cuerpo uterino.

factores de riesgo

historia de terapia hornonal estrogenica sustittiva sin oposicion progestacional
tratamiento con tamoxifeno
menopausia tardia
nuliparidad
infertilidad o falla terapeutica a inductores de ovulacion
obesidad

pruebas diagnosticas

el estudio histopatologico con biopsia ndometrial

legrado uterino fraccionado
histeroscopia.

diagnostico

sangrado uterino anormal
sangrado uterino anormal con antecedente de terapia estrogenica
cualquier sangrado uteriino en la postmenopausia

tratamiento

quirurgico en etapas tempranas

util para:
la estadificacion
tratamiento primario

implica:
lavado peritonial
histerectomia extrafascial, salpingo-ooferectomia