



# **UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

## **ESCUELA DE MEDICINA**

**Ana Laura Villatoro Ortiz**

**Clínica de Ginecología y Obstetricia**

**Semestre: 7°**

**Grupo: "B"**

**Dr. Romeo Suarez Martínez**

**Comitán de Domínguez, Chiapas**

**a 26 de Noviembre del 2020.**

Método Anticonceptivo	Uso	Beneficio	Ventaja	Desventaja	Presentación	Dosis
<b>Oral</b>	Temporal	Efectividad 92-99%	Fácil de conseguir	Requiere disciplina, de lo contrario efectividad disminuye		1 pastilla cada 24 horas
<b>Inyectable</b>	Intramuscular Larga acción	Efectividad 99%	Se puede aplicar durante lactancia y después de parto	Sangrado irregular, cefalea, cambio de peso	Estrógeno Progestina	1 inyección cada mes o cada 2 meses
<b>Subdérmico</b>	Subdérmico Acción prolongada	Efectividad 99% 1° año, disminuyendo gradualmente	Utilizado hasta por un par de años	Molestia No protege contra ETS		
<b>Parche</b>	Dérmico Temporal	Eficaz a 24 hrs de su aplicación Efectividad 99%	Fácil de aplicar	Irritación Caerse	Plástico, cuadrado, adherible a piel	
<b>Condón</b>	Látex aplicado en pene en erección	Protección anticonceptiva 85-97% Prevención ETS	Prevención ETS Se consiguen fácilmente	Puede romperse con facilidad		
<b>Dispositivo Intrauterino</b>	Temporal Intrauterino	Efectividad 95-99%	Reversible Aplicar inmediatamente después de parto	Cambio menstrual Sangrado vaginal abundante y prolongado	Cobre Hormonal	
<b>Oclusión Tubaria Bilateral</b>	Permanente Oclusión bilateral de trompas uterinas	Protección >99%	No interfiere con lactancia, acto sexual, sin efectos secundarios, recuperación rápida, efecto protector contra Ca de ovario	No protege contra ETS		
<b>Vasectomía</b>	Permanente Oclusión bilateral de conductos deferentes	Protección anticonceptiva >99%	Recuperación rápida	No protege contra ETS		