



**Universidad del Sureste**  
**Escuela de Medicina**

## **CLINICA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

---

**Presenta**

**Anel Guadalupe Gordillo Abadía**

**7to. "A"**

**Docente**

**DR. Romeo Suarez Martínez**

***Comitán de Domínguez, Chiapas***

***Noviembre 2020***

<b>Método</b>	<b>Uso</b>	<b>Beneficios</b>	<b>Ventajas</b>	<b>Desventajas</b>	<b>Dosis</b>
<b>Cirugía de esterilización femenina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sólo se hace el procedimiento una vez.</li> <li>-Permanente.</li> </ul>	protege contra embarazos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante el resto de tu vida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Es una intervención quirúrgica segura, con una baja incidencia de complicaciones fatales.</li> <li>-El riesgo es una sola vez cuando la paciente se opera y no es constante como ocurre con la pastilla, el dispositivo intrauterino, etc.</li> <li>-Es el método ideal para aquellas parejas que no desean más hijos, en razón por la cual es uno de métodos más efectivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dolor</li> <li>-Sangrado</li> <li>-Infección u otras complicaciones después de la cirugía</li> <li>-No protege contra las enfermedades de transmisión sexual</li> </ul>	Sólo se hace el procedimiento una vez.
<b>Implante anticonceptivo para mujeres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sólo se hace el procedimiento una vez.</li> </ul>	-Algunas mujeres experimentan la mejoría en el acné que sigue	-Alta eficacia del hasta 99 por ciento en el plazo de siete días de	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dolor/calambres</li> <li>-Malestar en la pelvis o espalda</li> <li>-Sangrado vaginal</li> </ul>	Sólo se hace el procedimiento una vez.

	-Permanente.	el uso del implante -Una cierta protección contra cánceres endometriales	inserción del implante -Método muy barato de contracepción a largo plazo, comparable a los dispositivos intrauterinos -Independiente de la memoria o del horario del utilizador, y de la cópula sexual, como ofrece la contracepción continúa		
<b>Cirugía de esterilización masculina</b>	-Sólo se hace el procedimiento una vez. -Permanente	La vasectomía no altera las hormonas ni afecta el deseo sexual.	-Es un método anticonceptivo completamente seguro y eficaz. -Es una intervención quirúrgica muy sencilla que no necesita hospitalización, que se realiza con anestesia local.	-Dolor -Sangrado -Infección	Sólo se hace el procedimiento una vez.

<b>DIU de cobre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lo coloca un proveedor de atención médica.</li> <li>-Dura hasta 10 años.</li> </ul>	<p>No se asocia al cáncer de ninguna contracepción hormonal desemejante del órgano</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Es altamente efectivo, con un índice de éxito del por ciento 98-99 durante cinco años de uso del DIU</li> <li>-Puede ser utilizado por casi cualquier mujer incluyendo nulíporo</li> <li>-Su acción dura por diez años si no se quita mientras tanto</li> <li>-El inicio de la acción es inmediato</li> <li>-Es independiente de la actividad sexual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Calambres</li> <li>-Períodos más largos y abundantes</li> <li>-Manchado entre períodos</li> </ul>	<p>1 cada 10 años</p>
<b>DIU con progestina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lo coloca un proveedor de atención médica.</li> <li>-Dura hasta 3-5 años, dependiendo del tipo.</li> </ul>	<p>Puede ayudar a reducir los cólicos menstruales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-El DIU hormonal es seguro y tiene un 99 % de eficacia en la prevención del embarazo.</li> <li>-No requiere mantenimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sangrado irregular</li> <li>-Falta de períodos (amenorrea)</li> <li>-Dolor abdominal/pélvico</li> </ul>	<p>-Es un método anticonceptivo de larga duración, pues dura entre 3 y 7 años.</p>

			<p>diario ni regular, y no tiene que ir a la farmacia para resurtirlo. Funciona hasta que caduque o se lo retiren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se puede usar inmediatamente después de haber tenido un bebé y durante la lactancia materna.</li> </ul>		
<b>Varilla implantable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lo coloca un proveedor de atención médica.</li> <li>-Dura hasta 3 años.</li> </ul>	<p>Puede ser utilizado durante la lactancia, ya que no tiene efectos sobre la cantidad ni la calidad de la leche materna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Efectividad anticonceptiva del 99% de forma continuada, por lo que la posibilidad de que se produzca un embarazo es prácticamente nula.</li> <li>-No requiere una rutina diaria.</li> <li>-Vida útil prolongada.</li> <li>Discreto y fácil de usar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cambios en la menstruación</li> <li>-Cambios en el humor o estado de ánimo deprimido</li> <li>-Aumento de peso</li> <li>-Dolor de cabeza</li> <li>-Acné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implanon consiste en una sola varilla y puede ser utilizado durante un máximo de 3 años desde su colocación</li> <li>- Jadelle está constituido por dos varillas. Este dispositivo puede utilizarse durante 5 años desde su colocación.</li> </ul>

<p><b>Inyección</b></p>	<p>-Es necesaria una inyección cada 3 meses.</p>	<p>-reduce el sangrado con los períodos, con lo cual se disminuye el riesgo de anemia . - No contienen estrógeno , de modo que pueden ser usados por mujeres que no pueden tomar estrógenos.</p>	<p>-La inyección reduce los síntomas de la endometriosis . -La inyección reduce la frecuencia de las convulsiones en mujeres que tienen un trastorno de convulsiones. -La inyección reduce la cantidad de crisis drepanocíticas en mujeres que tienen la enfermedad drepanocítica .</p>	<p>-Pérdida de densidad ósea -Sangrado irregular/Sangrado entre períodos -Dolores de cabeza -Aumento de peso -Nerviosismo Mareos -Malestar abdominal</p>	
<p><b>Anticonceptivos orales “la píldora” (píldora combinada)</b></p>	<p>Debe tomar una píldora todos los días.</p>	<p>Menor riesgo de cáncer de ovario y de endometrio, embarazo ectópico, quistes de ovario, enfermedad mamaria benigna</p>	<p>-Alivio del síndrome premenstrual (SPM) -Períodos más cortos, más leves y más predecibles o, en el caso de algunos tipos de píldoras</p>	<p>-Manchado/ sangrado entre períodos -Náusea Sensibilidad en los senos -Dolor de cabeza</p>	<p>-una píldora todos los días y comenzar un nuevo paquete cuando terminas el que estabas tomando (cada 28 días).</p>

			<p>combinadas, menos períodos al año</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Reducción de la producción de andrógenos causada por el síndrome de ovario poliquístico</li> </ul>		
<p><b>Anticonceptivos orales “la píldora” (píldora combinada de uso extendido/continuo)</b></p>	<p>Debe tomar una píldora todos los días.</p>	<p>Prevención y tratamiento del sangrado excesivo relacionado con los fibromas uterinos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Prevención de las migrañas menstruales</li> <li>-Disminución del agravamiento de ciertas enfermedades relacionadas con la menstruación, incluidas las convulsiones</li> <li>-Alivio del dolor relacionado con la endometriosis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Manchado/sangrado entre períodos</li> <li>-Náusea</li> <li>Sensibilidad en los senos</li> <li>-Dolor de cabeza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-estos paquetes contienen 84 píldoras activas y 7 píldoras inactivas.</li> <li>- píldoras disponibles para 365 días</li> </ul>
<p><b>Anticonceptivos orales “la minipíldora” (solo progestina)</b></p>	<p>Debe tomar una píldora a la misma hora todos los días.</p>	<p>reduce la probabilidad de la enfermedad pélvica inflamatoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-no son asociadas con un incremento del riesgo de TVP o enfermedades cardiovasculares.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Manchado/sangrado entre períodos</li> <li>-Náusea</li> <li>- Sensibilidad en los senos</li> <li>-Dolor de cabeza</li> </ul>	<p>1 minipíldora todos los días a la misma hora.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Con el riesgo de coagulación disminuida</li> <li>-no están contraindicadas en pacientes con anemia de células falciformes.</li> </ul>		
<b>Parche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Colóquese un parche nuevo cada semana durante 3 semanas (21 días en total).</li> <li>-No se coloque un parche durante la cuarta semana.</li> </ul>	s por lo fácil que es de utilizar: te pones un parche y te olvidas hasta los siguientes siete días.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tiene un alto porcentaje de efectividad (99%).</li> <li>-Libera de forma uniforme el fármaco.</li> <li>-Sólo se utiliza durante tres semanas al mes.</li> <li>-La efectividad del parche no se reduce en caso de colitis o vómitos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Manchado o sangrado entre períodos menstruales</li> <li>-Náusea Dolor estomacal</li> <li>-Sensibilidad en los senos Dolor de cabeza</li> <li>-Irritación cutánea (en la piel)</li> </ul>	Se coloca el parche sobre la piel una vez por semana durante tres semanas, es decir que usarás un parche por un total de 21 días.
<b>Anillo vaginal anticonceptivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Colóquese el anillo en la vagina usted misma.</li> <li>-Mantenga el anillo en la</li> </ul>	El anillo se hace del copolímero del acetato del vinilo del etileno, en su base, en la cual las hormonas son	<ul style="list-style-type: none"> <li>-El uso del anillo se asocia a un más poco arriesgado de la extracción de aire intermenstrual o irregular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Secreción vaginal, malestar en la vagina e irritación suave.</li> <li>-Dolor de cabeza</li> <li>-Cambios en el humor</li> </ul>	requiere solamente al utilizador cambiarlo una vez al mes

	vagina durante 3 semanas y luego quíteselo por una semana	integradas. Esto significa que el daño del anillo no causará niveles más altos de baja de la hormona	-Trabaja bien incluso si la mujer tiene trastornos gastrointestinales	-Náusea Sensibilidad en los senos	
<b>Diafragma con espermicida</b>	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales.	Puede usarse durante la lactancia, siempre y cuando la vagina y la cerviz ya hayan vuelto a su tamaño original previo al embarazo	-Es recomendable para las mujeres que no quieren o no pueden utilizar anticoncepción hormonal, ya que no tiene ninguno de sus tipos de efectos secundarios. -El diafragma no tiene efectos negativos sobre la fertilidad	-Irritación -Reacciones alérgicas -Infección del tracto urinario	Se coloca antes de la relación sexual
<b>Esponja con espermicida</b>	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales.	Es un método que pueden emplear mujeres que desean ocultar que están utilizando un sistema anticonceptivo, porque en ningún	-No tiene los efectos secundarios que pueden presentar los métodos hormonales - Se puede colocar varias horas antes de	-Irritación - No se puede usar durante la menstruación - No protege de enfermedades de transmisión sexual o del sida.	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales.

		caso va a ser apreciado por la pareja, y tampoco se necesita su ayuda o colaboración.	mantener las relaciones sexuales y, por lo tanto, no es necesario interrumpirlas una vez iniciadas.		
<b>Cápsula cervical con espermicida</b>	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales	La cubierta cervical tiene una efectividad del 84% al 91% para las mujeres que nunca han dado a luz. Es del 68% al 74% efectivo para las mujeres que sí han dado a luz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- son prácticos y te permiten tener el control.</li> <li>- no interrumpen la relación sexual.</li> <li>- no tienen hormonas.</li> <li>- duran mucho tiempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Irritación</li> <li>-Reacciones alérgicas</li> <li>-Resultado anormal de la prueba de Papanicolaou</li> </ul>	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales
<b>Condón masculino</b>	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales. Proporciona protección contra algunas enfermedades de transmisión sexual (ETS).	-Tiene una eficacia del 95 al 98% si se emplea de manera adecuada. - Normalmente los fallos suelen derivar de una mal colocación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Es muy económico.</li> <li>-Una unidad cuesta menos de un euro.</li> <li>-No es precisa prescripción médica para su utilización.</li> <li>-Los condones se venden en cualquier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Irritación</li> <li>-Reacciones alérgicas</li> </ul>	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales.

			farmacia e incluso en otro tipo de establecimientos.		
<b>Condón femenino</b>	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales. Proporciona protección contra algunas enfermedades de transmisión sexual (ETS).	No produce alergia, por lo que es una buena opción cuando se tiene alergia al látex	-Proporciona mayor autonomía a la mujer para controlar su fertilidad y su salud sexual. - no tiene efectos secundarios -El componente con el que está fabricado, nitrilo, es muy resistente, con lo cual las probabilidades de romperse son menores.	-Malestar o dolor durante la penetración o el acto sexual. -Sensación de quemazón, erupción o picazón	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales.
<b>Espermicida solo</b>	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales.	Se suelen usar para aumentar la efectividad de métodos anticonceptivos de barrera como los preservativos o el diafragma.	- Son económicos - No contienen hormonas - fácil de usar -No necesita control médico periódico.	-Irritación -Reacciones alérgicas -Infección del tracto urinario	Debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales.

<p><b>-Levonorgestrel</b></p>	<p>Tome las píldoras lo antes posible dentro de los 3 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección.</p>	<p>se usa para evitar el embarazo después de una relación sexual sin protección (tener relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo o con un método anticonceptivo que falló o que no se usó de manera correcta</p>	<p>ayudar a reducir o prevenir lo siguiente:          -el acné          -el adelgazamiento de los huesos            -los quistes en los senos o en los ovarios          - el cáncer de endometrio (la capa interior de tu útero) y el cáncer de ovarios</p>	<p>-Cambios en la menstruación          -Dolor de cabeza          Náusea          -Mareos Vómitos          -Dolor en el pecho          -Cansancio          -Dolor en la parte inferior del estómago (abdominal)</p>	<p>-1.5 mg (1 píldora) dosis única          - 0.75 mg (2 píldoras)</p>
<p><b>Acetato de ulipristal (Ulipristal Acetate)</b></p>	<p>Tome las píldoras dentro de los 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección.</p>	<p>anticonceptivo de emergencia o como respaldo en caso de que un método anticonceptivo falle o se use de forma incorrecta.</p>	<p>ayudar a reducir o prevenir lo siguiente:          -el acné          -el adelgazamiento de los huesos            -los quistes en los senos o en los ovarios          - el cáncer de endometrio (la capa interior de</p>	<p>-Dolor de cabeza          -Náusea          Dolor abdominal          Dolor menstrual          Cansancio Mareos</p>	<p>-FEMELLEONE:          El tratamiento consiste en la administración de un comprimido de FEMELLEONE por vía oral lo antes posible, pero como máximo 120 horas (5 días) después de haber mantenido</p>

			tu útero) y el cáncer de ovarios		relaciones sexuales sin protección o haberse producido un fallo del anticonceptivo utilizado.
--	--	--	-------------------------------------	--	--