



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

Presenta: Mayra Mercedes Lopez Morales

MATERIA: ginecología

Semestre: 7°

Grupo: "B"


Docente: Dr. Suarez Martínez Romeo

Comitán de Domínguez, Chiapas

14 de enero del 2021.




Endometriosis





Cáncer de ovario





Miomatosis uterina

Definición

Tumores benignos del músculo liso del útero (malignos $\leq 1\%$).
Tamaño variable, milímetros a grandes tumores que ocupan toda la cavidad abdominal.

Factores de Riesgo

-Rango de edad para la aparición puede ir desde los 20 a 70 años. Mayor incidencia de 35 a 45 años.
- Nuliparidad
-Obesidad y sobrepeso por el efecto estrogénico sostenido

Menarca temprana.
Menopausia tardía.
Tumores ováricos productores de estrógenos.
Ingesta de altas dosis y tiempo prolongado de hormonales orales.

tratamiento

-Medroxiprogesterona
-AINES
-Análogos de la hormona liberadora de gonadotropina
-dispositivos endouterinos de prostágenos

Clasificación de los leiomiomas

-Se clasifican según su ubicación y dirección de crecimiento:

- Submucosos
- Subserosos-parasitarios
- Intramurales
- Pediculados

Diagnóstico

50% de las miomatosis son asintomáticas

- La hemorragia uterina anormal se presenta en el 21.4% de las pacientes.
- Los síntomas de compresión dependerán del tamaño y ubicación del tumor.
 - 33% presenta dolor pélvico.
- Tacto bimanual (recto-vaginal) tiene una alta sensibilidad cuando el mioma mide mas de 5 cm.

Síntomas

La mayoría de mujeres con miomas cursa asintomática.
Hemorragia
Dolor
Sensación de presión
Infertilidad

Mastitis

Mastitis

Inflamación de tejido mamario
Infecciosa /No infecciosa

Tratamiento

-Antibiotico resistente B. Lactamasa
-Ibuprofeno
-Paracetamol
-Cefalexina / amoxicilina

Diagnostico

Clinica
Laboratorio
Ultrasonido mamario
Biopsia

Clasificación

-Puerperal
-No puerperal
-Infecciosa

-Aguda
-Cronica

Factores de riesgo

Retención de leche


Obstrucción de los conductos lactíferos

- Tomas de leche poco frecuentes
- Separación de tomas de forma súbita
- Agarre inadecuado del niño con extracción ineficaz de la leche
- Separación entre la madre y el recién nacido las primeras 24 horas de vida

Factores maternos


Disminución de las defensas maternas relacionadas con el postparto y el estrés

- Malnutrición
- Mastitis previa
- Estado de portador de Staphilococcus Aureus en la nariz del bebe
- Variaciones en la anatomía de la mama (pezón plano o pezón invertido)
- Aplicación de presión sobre el pecho.





Tumores benignos



Miomatosis uterina

