



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina

### **MAPAS CONCEPTUALES**

## **CLINICAS GINECOLOGICAS COMPLEMENTARIAS**

---

Presenta

Melanny Guadalupe Roman Salazar

Dr. Romeo Suarez Martinez

Comitán de Domínguez, Chiapas

08 de enero 2021

# CANCER ENDOMETRIAL

## DEFINICION

Neoplasia glandular maligna originada en la capa interna del utero, es el tumor mas frecuente tras el cacer de mama en países desarrollados, mas común a los >50 años a 70 años.

## FACTORES DE RIESGO

- Historia de terapia hormonal estrogenica sustitua sin oposición progestacional
- Tx con tamoxifeno
- Menopausia tardia
- Multiparidad
- Infertilidad
- Tumor ovárico
- HAS
- DM


## MANIFESTACIONES CLINICAS

Premenopausica  
Ant menstruaciones prolongadas abundantes o manchado intermenstrual

Posmenopausica  
Metrorragia  
Secreciones vaginales

## METODOS DIAGNOSTICOS

- Usg
- Papanicolaou
- Biopsia endometrial ambulatoria
- Histeroscopia
- Marcador tumoral



## TRATAMIENTO

- Histerectomia total
- Salpingo oferectomia bilateral
- Linfadenectomia bilateral pélvica y para aortica
- Radioterapia, braquiterapia
- Teleterapia

AINES (dolor pélvico).  
Anticonceptivos orales combinados (danazol, gestriona, acetato de medroxiprogesterona).  
Inyeccion de agosnistas de la GnRH  
DIU LNG

# CANCER DE OVARIO

## DEFINICION

Termino que se utiliza cuando las células que constituyen y forman el ovafrio comienzan a crecer de forma descontrolada y pueden prolongarse.

## FACTORES DE RIESGO

- Genéticos
- Ambiental
- Reproductivos

- Ant. nuliparidad
- retraso de la maternidad
- menarca temprana
- retraso de la menopausia

## • CLASIFICACION

- Crecimiento local
- Diseminacion peritoneal
- Diseminacion hematogena
- Diseminacion linfatica

- SEGÚN GRADO, 1, 2 Y 3

## MANIFESTACIONES CLINICAS

- Dolor de espalda
- Estreñimiento
- Sangrado vaginal
- Poliuria
- Cansancio
- Dispepsia
- Meteorismo
- Saciedad temprana
- Colicos

## METODOS DIAGNOSTICOS

- Ecografia
- Marcadores tumorales
- Estadificacion quirurgica

## TRATAMIENTO

Histerectomia con salpingoforectomia bilateral

Cirurgia citorreductora

Quimioterapia posoperatoria



# ENDOMETRIOSIS

## DEFINICION

Presencia de tejido endometrial funcional, glándulas y estroma fuera de la cavidad uterina, en ovarios y en la superficie del peritoneo pélvico, la cual induce una rx inflamatoria crónica.

## FACTORES DE RIESGO

- Obstrucción del flujo menstrual
- Menarquia precoz
- Retraso en el inicio de paridad
- Menopausia tardía
- Obesidad
- Bajo peso al nacer
- Alcoholismo
- Defectos anatómicos

## MANIFESTACIONES CLINICAS

Dolor en forma de dismenorrea secundaria  
Dolor pélvico generalizado  
Sangrado uterino anormal  
Dispareunia

## METODOS DIAGNOSTICOS

- Clínico
- Evaluación por infertilidad
- Incidentalmente

### Estudios de imagen

- Ecografía pélvica por vía suprapúbica y endovaginal
- Resonancia magnética abdomino-pélvica.
- Laparoscopia

## TRATAMIENTO

Individualizar en función del paridad

AINES (dolor pélvico).

Anticonceptivos orales combinados (danazol, gestrinona, acetato de medroxiprogesterona).

Inyección de agonistas de la GnRH

DIU LNG



# MIOMATOSIS

## DEFINICION

Tumores benignos del musculo liso del utero, malignizan mas del 1%, de tamaño variable, dependientes de estrógeno y progesterona.

## FACTORES DE RIESGO

- Edad 20 – 70 años
- Multiparidad
- Obesidad y sobrepeso
- Exposición a estrógenos

## TIPOS

- Subseroso
- Intramural
- Submucoso

## MANIFESTACIONES CLINICAS

- 50% asintomáticas
- Hemorragia uterina anormal
- Dolor pélvico
- Metrorragia
- Menorragia
- Dismenorrea

## METODOS DIAGNOSTICOS

- Ultrasonido
- Laparoscopia
- Histerosalpingrafia
- Biopsia
- Examen pélvico

## TRATAMIENTO

- Análogos GNHR
- Medroxiprogesterona
- AINES

- DIU con progesterona
- Miomectomia
- Miomentormia
- Histeroscopia



# MASTITIS

## DEFINICION

Inflamación de uno o varios lobulos de la glandula mamaria , acompañada o no de infección.

## FACTORES DE RIESGO

- Retención de leche
- Obstrucción de los conductos lactíferos
- tomas de leche infrecuentes
- agarre inadecuado
- Factores maternos
- Disminución de defensas
- Malnutrición
- Mastitis previa
- Mal uso de bombas de extracción
- Higiene inadecuada
- Uso de pomadas


## MANIFESTACIONES CLINICAS

- Dolor mamario
- Inflamación
- fiebre  $>38^{\circ}$
- dolores articulares
- nauseas



## METODOS DIAGNOSTICOS

- Clínico
- Mediante un cultivo de leche



## TRATAMIENTO

- Medidas generales: adecuada hidratación, nutrición y reposo
- Usar sujetador no ajustado
- Aplicar calor local antes de las tomas

- Drenaje de pecho
- Iniciar tomas frecuentes de leche
- Masaje de la mama
- Compresas frias

- Farmacológico:
- Amoxicilina c/clavulanico
- Ampicilina
- Cefalexina
- Dicloxicilina
- Eritromicina

# NEOPLASIAS BENIGNAS DE LA MAMA

## DEFINICION

Tumor localizado, delimitado, regularmente con una capsula fibrosa, de forma regular y células bien diferenciadas. Una neoplasia benigna no invade el tejido adyacente ni metastatiza, solo causa daño por compresión a los órganos o tejidos vecinos y no recurre después de la extirpación quirúrgica.

## CLASIFICACION

- Fibroadenoma
- Tumores filoides
- Papiloma intraductal

## FACTORES DE RIESGO


- Herencia
- Edad mayor de 40 años
- Menarquia precoz
- Menopausia tardia
- Nuliparidad
- Terapia de reemplazo hormonal largo plazo

## MANIFESTACIONES CLINICAS

- Bultos a nivel mamario
- Mstalgia
- Mastitis
- Necrosis grasa
- Dolor mamario
- Modularidad
- Sensibilidad mamaria
- Descarga por el pezón
- Infección
- Inflamación


## METODOS DIAGNOSTICOS

- Exploracion física
- Pruebas de imagen (mastografía o ecografía)
- biopsia



## TRATAMIENTO

Conservador, observación (2 – 3 cm)  
Extirpación >3  
Cirugía morfológica, mediante incisión periareolar.



# CANCER DE MAMA

## DEFINICION

Crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tiene la capacidad de diseminarse.

## FACTORES DE RIESGO

- Mujer
- Edad >50 años
- Mutaciones genéticas (BRCA1, BRCA2).
- Inicio de menstruación temprana
- Mamas densas
- Antecedentes personales
- Antecedentes familiares
- Tratamientos previos con radioterapia
- Sobrepeso
- Alcoholismo

## MANIFESTACIONES CLINICAS

- Bulto o engrosamiento en la mama
- Cambio de tamaño, forma o aspecto de la mama.
- Cambios en la piel que se encuentra sobre la mama
- Formación de hoyuelo
- Inversión del pezón
- Descamación, desprendimiento de la piel
- Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre la mama (piel de naranja).

## METODOS DIAGNOSTICOS

- Estudios de imagen (mastografía, ultrasonido mamario), resonancia magnética.
- Biopsias
- Estudio histopatológico

- Estudios complementarios
- Bh
- Tiempos de coagulación
- Química sanguínea
- Pruebas de funcionamiento hepático
- Fosfatasa alcalina

## TRATAMIENTO

Opción primaria: escisión completa del tumor mas radioterapia.

Segunda opción: mastectomía con o sin reconstrucción

Tercera opción: Escisión sola seguida por observación clínica

Mastectomia simple con opción a reconstrucción

Tratamiento farmacológico: quimioterapia adyuvante, terapia endocrina, terapia de apoyo, farmacos no opioides.

Dependerá de la fase en que se encuentre la paciente.