

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

“mapas conceptuales”

Presenta la alumna:

María de Jesús Peñaloza Landa

7mo semestre grupo B

Docente: Romeo Suárez Martínez

Materia: clínica de ginecología y obstetricia

Comitán de Domínguez, Chiapas, 15 de enero, 2021

Cáncer endometrial

Definición

Neoplasia glandular maligna que se origina en la capa interna del cuerpo uterino. La mayoría son adenocarcinomas

Factores de riesgo

- Historia de terapia hormonal estrogénica.
- Tratamiento con tamoxifeno.
- Menopausia tardía.
- Nuliparidad.
- Infertilidad, o falla terapéutica a inductores de ovulación.
- Obesidad, diabetes, HTA.

Manifestaciones

Sangrado uterino anormal.

- Estudio histopatológico de biopsia endometrial.
- Legrado uterino fraccionado.
- Histeroscopia.

Diagnóstico

Tratamiento

Tratamiento quirúrgico en etapas tempranas: histerectomía, ooforectomía, linfadenectomía.

Radioterapia, braquiterapia, teleterapia.

Cáncer ovárico

Definición

Los tumores epiteliales cancerosos reciben el nombre de carcinomas. Aproximadamente de 85 a 90% de los cánceres de ovario malignos son carcinomas ováricos epiteliales.

Factores de riesgo

- Edad avanzada.
- Mutaciones genéticas hereditarias.
- Antecedentes familiares.
- Terapia de reemplazo hormonal con estrógeno.

Manifestaciones

Distensión abdominal.
Dolor pélvico o abdominal.
Sensación de saciedad rápidamente.
Síntomas urinarios, como frecuencia.
Fatiga.
Molestias estomacales.

Diagnóstico

- Examen pélvico
- Diagnóstico por imagen
- Laboratorios
- Biopsia
- Estudio histopatológico

Tratamiento

Cirugía: ooforectomía.
Quimioterapia, radioterapia.

Endometriosis

Definición

Trastorno en el que el tejido que normalmente recubre el útero crece fuera de él.

Factores de riesgo

- Nuliparidad.
- Menarca temprana.
- Menopausia tardía.
- Niveles elevados de estrógenos.
- Antecedentes familiares.

Manifestaciones

La endometriosis puede causar dolor, a veces intenso, especialmente durante los períodos menstruales. También se pueden presentar problemas de fertilidad.

Diagnóstico

- Examen pélvico.
- Ecografía transvaginal.
- Resonancia magnética.
- Laparoscopia.

Tratamiento

- Analgésicos
- Terapia hormonal
- Cirugía de conservación.
- Tratamiento de fertilidad.
- Histerectomía completa

Miomatosis

Definición

Son tumores benignos más frecuentes del útero.

Factores de riesgo

- Nuliparidad.
- Obesidad y sobrepeso
- Menarca temprana
- Menopausia tardía
- Terapia hormonal prolongada

Manifestaciones

50% de las veces es asintomático.
Puede presentarse hemorragia anormal.

Diagnóstico

- Exploración ginecológica
- Tacto bimanual (alta especificidad si el mioma es mayor a 5cm).
- Ultrasonido
- Histeroscopia
- Resonancia magnética (cando aún existen dudas).

Tratamiento

- GnRh.
- AINES.
- Miomectomía.
- Medroxiprogesterona.
- Dispositivos endouterinos (para hemorragia)

Neoplasias benignas de la mama

Definición

Son tumores benignos en la mama.

Puede ser definida como nódulo, si destaca de manera independiente del tejido mamario que lo circunda, o bien como placa si lo que notamos es un engrosamiento de una zona de la mama sin poder notar con claridad los bordes.

Manifestaciones

Según su localización, tamaño y velocidad de crecimiento los tumores mamarios podrán producir:

- Secreción por pezón.
- Nódulos palpables.
- Dolor

Diagnóstico

Exploración mamaria

Mamografía

Ecografía

Punción

Tratamiento

AINES

Tamoxifeno

En las mujeres con mastalgia y con terapia hormonal de remplazo se recomienda suspenderse.

Mastitis

Definición

inflamación en el tejido mamario que a veces implica una infección.

Factores de riesgo

- comúnmente afecta a las mujeres que está amamantando (mastitis asociada con la lactancia).
- Un conducto mamario bloqueado.
- Infección.

Manifestaciones

La inflamación provoca dolor, edema, calor y enrojecimiento en las mamas. Es posible que también se presente fiebre y escalofríos.

Diagnóstico

Exploración física.

Se puede realizar un cultivo de leche materna en caso de que sea una infección.

Tratamiento

- Analgésicos.
- Antiinflamatorios.
- Antibióticos si existe infección.

Cáncer mamario

Factores de riesgo

Crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tiene la capacidad de diseminarse.

Mutaciones genéticas.
Antecedentes familiares.
Tratamientos previos con radioterapias.

Diagnóstico

Examen de mama
Ecografía
Mamografía
Biopsia
Resonancia magnética
TAC.

Tratamiento

Lumpectomía
Mastectomía
Radioterapia
Extirpación de ambas mamas.
Quimioterapia
Terapia hormonal.
inmunoterapia