



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**ESCUELA DE MEDICINA**

**“CUADRO COMPARATIVO”**

**Brian Martin Morales López**

**Clínica de Ginecología y Obstetricia**

**Semestre: 7°**


**Grupo: “B”**

**Dr. Romeo Suarez Martínez**

**Comitán de Domínguez; Chiapas, a 27 de Noviembre del 2020.**



***CUADRO COMPARATIVO  
METODOS ANTICONCEPTIVOS***



## ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

	<i>USO</i>	<i>VENTAJAS</i>	<i>DESVENTAJAS</i>	<i>PRESENTACION</i>	<i>DOSIS</i>
<b>ANTICONCEPTIVOS ORALES</b>	<p>2 tipos:</p> <p>AO que contiene estrógeno y progestina (AOC).</p> <p>AO que solo contiene progestina.</p> <p>Combinados son los más utilizados.</p> <p>La inhibición total o parcial de la ovulación es uno de los mecanismos de acción. Las hormonas que contienen estos anticonceptivos actúan en el cerebro.</p>	<p>Seguros y controlados por la clienta.</p> <p>Reversibles: rápido retorno a la fertilidad.</p> <p>Las complicaciones graves son sumamente raras.</p> <p>99% más eficaces si se usan correcta y sistemática.</p> <p>No se necesita hacer nada durante el acto sexual.</p> <p>Beneficios para la salud no relacionados con la anticoncepción.</p>	<p>No son tan eficaces en el uso típico.</p> <p>Los efectos secundarios son comunes.</p> <p>Se requiere resumministro regular.</p> <p>Se deben tomar diariamente.</p> <p>Puede plantear riesgos de salud para un número reducido de mujeres.</p> <p>No protegen contra la ITS incluido VIH.</p>	<p>Anticonceptivos orales comprimidos (AOC).</p> <p>Píldoras solo de progestina (PSP).</p> <p>Píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE).</p>	<p>PAE:</p> <p>Anticonceptivos orales solo de progestina:</p> <p>Dentro de las 72 horas después de un acto sexual sin protección.</p> <p>Píldoras recetadas como anticonceptivos de emergencia: 1, repetir dosis a las 12 hrs.</p> <p>Píldoras regulares solo de progestina: 16, repetir dosis a las 12 hrs.</p> <p>Anticonceptivos orales combinados:</p> <p>Píldora de dosis bajas 4, repetir dosis a las 12 hrs.</p> <p>Píldora de dosis altas: 1, repetir dosis a las 12 hrs.</p>

<p><b>ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES</b></p>	<p>Tienen 3 mecanismos de acción: Evitar la ovulación, generar cambios en el endometrio y dificultar el paso de los espermatozoides.</p>	<p>El efecto del DMPA es prolongado, pero reversible.</p> <p>En general una mujer puede quedar embarazada a los 9-10 meses después de recibir la última inyección de DMPA.</p> <p>Se puede dejar de usar sin ayuda de un proveedor. Para discontinuar el uso la mujer simplemente deja de recibir las inyecciones, y el nivel de DMPA en la sangre y sus efectos anticonceptivos disminuyen gradualmente.</p> <p>Son seguros, considerablemente eficaces y fáciles de usar correcta y sistemáticamente.</p> <p>Son reversibles y pueden dejar de usarse sin la ayuda de un proveedor.</p>	<p>Los efectos secundarios y de anticonceptivos no se pueden detener inmediatamente.</p> <p>Puede persistir todo el tiempo que dura el efecto de la inyección (tres meses).</p> <p>En general, el regreso a la fertilidad después de la discontinuación suele retrasarse.</p> <p>Con frecuencia produce efectos secundarios, especialmente cambios en el sangrado.</p> <p>Los efectos secundarios más comunes de los inyectables combinados son el cambio de sangrado; en particular, el manchado o el sangrado prolongado irregular.</p>	<p>Acetato de Medroxiprogesterona de depósito (DMPA).</p> <p>Enantato de noretisterona (NET-EN).</p>	<p>Se administra en una dosis de 150 mg cada 3 meses.</p> <p>Se administra en una dosis de 200 mg cada 2 meses.</p>
---	--	---	---	--	---

<p><b><i>IMPLANTES</i></b></p>	<p>Los implantes subdermicos son capsulas que se colocan debajo de la piel del brazo de la mujer y que liberan lentamente una progestina en el torrente sanguíneo.</p>	<p>Es seguro y su eficacia es de por lo menos 99% en la prevención del embarazo.</p> <p>Durante los primeros tres años de uso, el Norplant es tan eficaz como la esterilización femenina.</p> <p>Fácil de usar.</p> <p>Efecto prolongado.</p> <p>Disminuye el sangrado menstrual.</p>	<p>Es menos eficaz en mujeres que pesan más de 70 kg.</p> <p>No se puede comenzar a usar ni discontinuar su uso sin la ayuda de un proveedor.</p> <p>Se requiere un procedimiento quirúrgico menor para insertarlo o extraerlo.</p> <p>No ofrece protección contra las ITS, incluidos VIH.</p>	<p>Notplant</p>	<p>1 capsula cada 5 años.</p>
<p><b><i>SISTEMAS INTRAUTERINOS</i></b></p>	<p>Constituyen un nuevo método de anticoncepción hormonal.</p> <p>Así como los DIU de uso más generalizado, tiene forma de T y se inserta en el útero. Sin embargo a diferencia de los DIU, los sistemas uterinos contienen progestina que se libera</p>	<p>Los SIU liberadores de hormonas ofrecen la ventaja de ser sumamente eficaces, de tener efecto prolongado y de ser seguros y reversibles.</p> <p>Reduce considerablemente el dolor, la duración y la cantidad de sangrado menstruales.</p> <p>Los estudios clínicos a largo plazo han indicado</p>	<p>El dispositivo puede causar manchado y sangrado irregular.</p> <p>No protegen contra la ITS, incluido el VIH.</p> <p>Estos dispositivos son costosos y difíciles de conseguir.</p>	<p>SIU</p>	<p>Sistema liberador de levonorgestrel.</p>

	lentamente en el útero.	que el SIU de LNG también puede proporcionar cierta protección contra la EPI.			
--	-------------------------	---	--	--	--