



ENFERMERIA
ANATOMIA Y FISILOGIA I

**TRANSTORNO DEL SISTEMA
TEGUMENTARIO**

LEN10EMC0620-A


409420078

YASHUA MANUELA PEREZ CARPIO

DOCENTE: OSCAR FABIAN GONZALEZ SANCHEZ

CICLO ESCOLAR: SEP2020

OBSERVACION DEL DOCENTE:



SÍNTOMAS

LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ACNÉ VARÍAN SEGÚN LA INTENSIDAD DEL

TRASTORNO:

- COMEDONES CERRADOS (POROS TAPADOS)
- COMEDONES ABIERTOS (POROS ABIERTOS)
- IRREGULARIDADES SENSIBLES ROJAS Y PEQUEÑAS (PÁPULAS)
- GRANOS (PÚSTULAS) QUE SON PÁPULAS CON PUS EN LA PUNTA
- BULTOS GRANDES, SÓLIDOS Y DOLOROSOS QUE ESTÁN DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA PIEL (NÓDULOS)
- BULTOS DOLOROSOS, LLENOS DE PUS QUE ESTÁN DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA PIEL (LESIONES CÍSTICAS)

CAUSAS

HAY CUATRO FACTORES PRINCIPALES QUE CAUSAN EL ACNÉ:

- PRODUCCIÓN EXCESIVA DE GRASA
- OBSTRUCCIÓN DE LOS FOLÍCULOS PILOSOS CON GRASA Y CÉLULAS CUTÁNEAS MUERTAS
- BACTERIAS
- EXCESO DE ACTIVIDAD DE UN TIPO DE HORMONAS (ANDRÓGENOS)

EL ACNÉ HABITUALMENTE SE PRESENTA EN EL ROSTRO, LA FRENTE, EL PECHO, LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA Y LOS HOMBROS, PORQUE EN ESTAS ZONAS DE LA PIEL SE ENCUENTRA LA MAYOR PARTE DE LAS GLÁNDULAS QUE PRODUCEN GRASA (GLÁNDULAS SEBÁCEAS). LOS FOLÍCULOS PILOSOS ESTÁN CONECTADOS A LAS GLÁNDULAS SEBÁCEAS.

LA PARED DEL FOLÍCULO PUEDE SOBRESALIR Y PRODUCIR UN COMEDÓN ABIERTO. O EL TAPÓN PUEDE ESTAR ABIERTO A LA SUPERFICIE Y ENTONCES OSCURECERSE, LO QUE PRODUCE UN COMEDÓN CERRADO. UNA ESPINILLA NEGRA PUEDE PARECER SUCIEDAD METIDA EN LOS POROS. PERO, EN REALIDAD, EL PORO ESTÁ LLENO DE BACTERIAS Y GRASA, ENTONCES SE OSCURECE CUANDO SE EXPONE AL AIRE.

Causas

HAY 2 TIPOS DE DERMATITIS DE CONTACTO.

DERMATITIS IRRITANTE DE CONTACTO: ESTE ES EL TIPO MÁS COMÚN. NO ES CAUSADA POR UNA ALERGIA, SINO QUE ES LA REACCIÓN DE LA PIEL A UNA SUSTANCIA O FRICCIÓN IRRITANTE. LAS SUSTANCIAS IRRITANTES PUEDEN INCLUIR ÁCIDOS, MATERIALES ALCALINOS COMO JABONES Y DETERGENTES, SUAVIZANTES DE TELAS, DISOLVENTES U OTROS QUÍMICOS. LOS QUÍMICOS MUY IRRITANTES PUEDEN CAUSAR UNA REACCIÓN JUSTO DESPUÉS DEL CONTACTO. LOS QUÍMICOS POCO IRRITANTES TAMBIÉN PUEDEN CAUSARLA DESPUÉS DE VARIOS CONTACTOS. LAS PERSONAS QUE TIENEN DERMATITIS ATÓPICA ESTÁN EN MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR DERMATITIS IRRITANTE DE CONTACTO. LOS MATERIALES MÁS COMUNES QUE PUEDEN IRRITAR LA PIEL INCLUYEN:

- CEMENTO
- TINTES PARA EL CABELLO
- EXPOSICIÓN PROLONGADA A PAÑALES HÚMEDOS
- PLAGUICIDAS O MATAMALEZAS
- GUANTES DE CAUCHO
- CHAMPÚS

DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA: ESTA FORMA DE LA AFECCIÓN SE PRODUCE CUANDO LA PIEL ENTRA EN CONTACTO CON UNA SUSTANCIA QUE LE PROVOCA UNA REACCIÓN ALÉRGICA A USTED EN PARTICULAR. LOS ALÉRGENOS COMUNES INCLUYEN:

- ADHESIVOS, INCLUSO LOS UTILIZADOS PARA LAS PESTAÑAS O PELUQUINES POSTIZOS.
- ANTIBIÓTICOS, COMO NEOMICINA FROTADA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA PIEL.
- BÁLSAMO DE PERÚ (UTILIZADO EN MUCHOS PRODUCTOS PERSONALES Y COSMÉTICOS, ASÍ COMO EN MUCHOS ALIMENTOS Y BEBIDAS).
- TELAS Y PRENDAS DE VESTIR, INCLUYENDO MATERIALES Y TINTES.
- FRAGANCIAS EN PERFUMES, COSMÉTICOS, JABONES Y CREMAS HUMECTANTES.
- ESMALTE DE UÑAS, TINTES PARA EL CABELLO Y SOLUCIONES PARA RIZADOS PERMANENTS.
- NÍQUEL Y OTROS METALES (SE ENCUENTRA EN JOYAS, CORREAS DE RELOJES, CREMALLERAS METÁLICAS, GANCHOS DE SOSTENES, BOTONES, NAVAJAS, ESTUCHES DE LÁPIZ LABIAL Y POLVOS COMPACTOS).

Referencias

(s.f.). Obtenido de <https://unisima.com/belleza/acne-quistico/>

INFOSALUS.(s.f.).Obtenidode

<https://www.infosalus.com/enfermedades/dermatologia/acne/que-es-acne-46.html>

MAYOCLINIC.(s.f.).Obtenidode

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/dermatitis-eczema/symptoms-causes/syc-20352380>