

Nombre de estudiante: Ángel de Jesús
Trujillo Morales

Nombre del profesor: Carlos Sandoval
Mancio

Nombre del trabajo: Principales
enfermedades en ovinos y caprinos

Materia: Zootecnia De Ovinos

Grado: 7°

Grupo: “A”

Principales enfermedades de los ovinos

Agalaxia contagiosa

- Sintomas { Mastitis, artritis, queratoconjuntivitis, abortos en ocasiones, aborto
- Descripción { La agalaxia contagiosa es una enfermedad grave de las ovejas y las cabras que se caracteriza por mastitis, artritis, queratoconjuntivitis y, en ocasiones, aborto. En las ovejas y cabras la causa principal de la enfermedad es Mycoplasma agalactiae (Ma), pero M.
- Tratamiento { No hay uno específico

Enfermedad de Nairobi

- Sintomas { La enfermedad comienza con fiebre, leucopenia, respiración rápida, anorexia y depresión profunda, seguido por diarrea fétida y una disminución concomitante de la temperatura corporal.
- Descripción { La enfermedad ovina de Nairobi se caracteriza por la presencia de gastroenteritis hemorrágica aguda.
- Tratamiento { La enfermedad ovina de Nairobi es una de las enfermedades más patogénicas de las ovejas y las cabras. En los animales susceptibles, esta infección viral produce una gastroenteritis hemorrágica con un alto índice de morbilidad y mortalidad. No existe un tratamiento eficaz.

Coccidiosis

- Sintomas { El síntoma más característico en los corderos infectados es la diarrea, con heces blandas y malolientes, que pueden ser sanguinolentas en el caso de E. ovinoidalis, mientras que en las infecciones por E. crandallii las heces son de color gris verdoso, con exudado mucoso y también puede producirse tenesmo rectal
- Descripción { La coccidiosis es una enfermedad infecciosa parasitaria producida por protozoarios (los animales más sencillos), denominados científicamente como Eimeria, también conocidos como coccidias, que se alojan en la mucosa intestinal de los ovinos
- Tratamiento { Antibióticos, fluidoterapia

Neumonía

- Sintomas { En los animales afectados, se pueden observar síntomas como fiebre, tos, descarga de moco verdoso por las fosas nasales y disnea con respiración dificultosa. Si bien la enfermedad afecta a ovinos de todas las categorías, los animales jóvenes son los más susceptibles.
- Descripción { Si bien los ovinos de todas las edades son afectados por neumonía, es en los corderos donde causa los mayores estragos. La enfermedad, por lo general, se presenta en sectores bien definidos, afectando en algunos años con particular violencia, a corderos destetados destinados para reemplazos.
- Tratamiento { Los más utilizados son la penicilina, oxitetraciclina, enrofloxacin y florfenicol.

Diarreas de los cabritos

- Sintomas { Diarrea de color verde, a veces con sangre o coágulos y mucus. La región perianal se encuentra a menudo manchada de color oscuro. Los cabritos presentan ojos hundidos por la deshidratación y anemia (la parte interna de los párpados (conjuntiva) se ve blanca en vez de rosada).
- Descripción { Durante la primera semana de vida, las causas más comunes de diarrea en los cabritos son las bacterias, especialmente la bacteria Escherichia coli (colibacilosis) y los virus, actuando solos o en forma asociada
- Tratamiento {