



**Nombre del alumno: Jiezer de Jesús
López Jiménez**

**Nombre del profesor: MVZ. Sandra
Edith Moreno López**

**Nombre del trabajo: Método de
crianza**

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Zootecnia de conejos

Grado: 7

Grupo: A

Ocosingo Chiapas a 20 de septiembre del 2020.

MÉTODO DE CRIANZA PARA UN CONEJO SILVESTRE EN CAUTIVERIO

Existen granjas que se dedican a la crianza de conejos silvestres en cautiverio, con el objetivo de la producción de carne o para liberación y repoblación del estado salvaje. Independientemente del objetivo, las granjas tienen dos áreas de manejo, una en la que se manejan los reproductores y los gazapos en crecimiento, los cuales posteriormente se preparan para la venta o la liberación.



Se suelen seguir dos tipos de explotación en este tipo de conejo, la que es en jaulas y la semiextensivo que se mantienen en colonias, en este caso tomando en cuenta el bienestar animal, la opción más viable sería el mantenimiento en colonias, ya que cuentan con amplio espacio para llevar a cabo sus funciones normales. Las granjas que realizan la reproducción mediante el mantenimiento de colonias sobre el suelo alojan a los reproductores en parques o cercados de dimensiones variables desde unas pocas decenas o centenares de metros cuadrados (sistema semiextensivo) hasta miles de metros cuadrados (sistema extensivo). El grado de control de la reproducción disminuye con la extensificación del sistema. En los sistemas de cría en cercados se disponen madrigueras o vivares para el refugio y la reproducción de los conejos. El diseño de las madrigueras dependerá del recurso económico del productor ya que existen muchos diseños.



El manejo de los gazapos comienza con su destete en torno al mes de edad, tras el cual pasan a los parques de engorda o asilvestramiento. En algunas explotaciones con reproducción en jaula los gazapos son mantenidos una o dos semanas en jaulas de post-destete antes de su paso a los parques, aprovechando esa fase para vacunarlos. En las explotaciones con reproductores alojados en cercados, los gazapos destetados se van extrayendo de los parques de reproducción para pasarlos a cercados de engorda o asilvestramiento.

Cuando los animales se alojan en cercados, además de pienso se les suele proporcionar paja y forraje (con frecuencia alfalfa).

Bibliografía consultada:

- Pedro González Redondo, Producción de conejo de monte: situación y perspectivas, 2017.