

**UNIVERSIDAD
DEL SUR**

CARRERA: LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

MATERIA: FISIOPATOLOGÍA

DOCENTE: DANIELA RUBÍ FLORES VÁZQUEZ

ALUMNO: CARRASCO GONZÁLEZ SALOMÉ


Grado: 4^a grupo: "A"

**TAPACHULA, CHIAPAS
SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

TS DE LA MOTALIDAD:

ERGE

- Condición sintomática causada por el reflujo de materia nociva desde el estomago al interior del esófago



ETIOLOGÍA

- Una de las causas más importantes y conocidas es la alteración a nivel del esfínter esofágico inferior, que es un anillo muscular que rodea al esófago en su unión con el estómago, y permanece cerrado impidiendo que el contenido del estómago vuelva de nuevo al esófago.

SÍNTOMAS

- Regurgitación
- Disfagia
- Odinofagía
- Hipo
- Dolor torácico o epigástrico
- Pérdida de esmalte en los dientes
- Nauseas.

CAUSAS

- Infección por H.pylori
- Alcohol
- Medicamentos
- Hernia hiatal

TRATAMIENTO

- Antiácidos
- Gastroscopia
- Penendoscopia
- Modificación en el estilo de vida

DIARREA

- Perdida de agua y electrolitos en un volumen superior al normal a través de la heces.

AGENTES CAUSALES

- E.Coli esterotóxica
- Rotavirus
- Compylobacter jejuni
- E.Coli enteropatógena
- Protozoarios
- salmonella

PRUEBA DIAGNOSTICA

- Examen de heces
- Sangre oculta en heces
- Hematología completa
- Electrolitos
- coprocultivo

TRATAMIENTO

- Consumo de electrolitos
- Medicamento antidiarreico (loperamida)

- Fiebre
- Dolor
- Cólicos
- Haces líquidas
- Tenesmo
- Deshidratación

TIPOS

- Diarrea aguda: menos de 14 días.
- Diarrea persistente: más de 14 días
- Diarrea crónica: 30 días



ESTREÑIMIENTO

- Expulsión disminuida de materias fecales, volumen insuficiente o resequead excesiva.

TRATAMIENTO

- Laxantes estimulantes + enemas + osmóticos
- Laxantes estimulantes + enemas+ procineticos
- Consumo de fibra
- Evitar alimento irritante

TRATAMIENTO

- Dieta rica en fibra
- Hidratación correcta
- Ejercicio físico

PRUEBA DIAGNOSTICA

- Colonoscopia




HEPATITIS

- Afección del hígado, infecciosa e inflamatoria

Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Leve Se Transmite	Grave Se Transmite	Más grave Se Transmite	Muy grave Se Transmite
<ul style="list-style-type: none"> Agua o alimentos contaminados Via oral o fecal 	<ul style="list-style-type: none"> Contacto con sangre, semen y fluidos corporales infectados Jeringuillas, agujas, cuchillas... Contagio al feto 	<ul style="list-style-type: none"> Contacto con sangre infectada: transfusiones no seguras, jeringuillas, agujas... Contagio madre - hijo 	<ul style="list-style-type: none"> Necesitas tener Hepatitis B Contacto con sangre infectada: transfusiones no seguras, jeringuillas, agujas...
Vacunación	Vacunación	Vacunación	Vacunación contra la hepatitis B
Síntomas Piel amarillenta, cansancio, vómitos	Síntomas Cronificación con o sin síntomas: ictericia, cirrosis, cáncer hepático	Síntomas Cronificación con o sin síntomas: cirrosis, cáncer	Síntomas Cronificación, síntomas agudos: ictericia, fiebre, cirrosis, cáncer
No daña el hígado de forma permanente			

COLESTASIA

- Disminución o interrupción del flujo biliar.



DIAGNOSTICO

- Fatiga
- Ictericia
- Prurito
- Xantomas
- Malestar abdominal
- Esteatorrea

PRUEBA DIAGNOSTICA


- Ecografía
- Ecografía endoscópica
- Colangiografía por resonancia magnética
- Tomografía
- Endoscopia

LITIASIS BILIAR

- Presencia de cálculos en el colédoco (vesícula biliar)

SÍNTOMAS

- Dolor
- Nauseas
- Vómitos
- Fiebre
- Ictericia leve



TRATAMIENTO

- Evitar consumo de gases, irritantes y mayormente las grasas

PRUEBA DIAGNOSTICA

- Biometría
- Perfil hepático
- Ecografía abdominal
- Radiografía de abdomen