



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS TABASCO

LIC. ENFERMERIA

DOCENTE: LIC. JUANA INES HERNANDEZ LOPEZ

7MO CUATRIMESTRE GRUPO: Q

ALUMNO: CARLOS EDUARDO MAGAÑA OSORIO

PRACTICA CLINICA II

CUADRO SINOPTICO:

*ULCERAS POR PRESION

*PREVENCION POR CAIDAS

INVESTIGACION:

*PARACENTESIS

*TORACENTESIS

*PUNCION LUMBAR

*PERICARDIOCENTESIS

VILLAHERMOSA TABASCO, 5 DE DICIEMBRE DEL 2020

ULCERAS POR PRESION

DEFINICION

Son lesiones de piel o tejidos adyacente debido a una isquemia de las misma, producidas por una presión prolongada de los tejidos sobre un plano duro

ESTADIOS

Estadio 1: Enrojecimiento de la piel que no cede al desaparecer la presión (se observa edema, induración, decoloración y color local)

Estadio 2: La zona presenta una erusion superficial limitada a la epidermis o al a dermis, se forma ampollas o cráter superficial.

Estadio 3: La ulcera es más profunda y afecta a la totalidad de la dermis y al tejido subcutáneo afectando también a la fucsia muscular.

Estadio 4: La lesión se extiende hasta el musculo, hueso o estructura de sostén tendón, capsula articular.

FACTORES DESENCADENANTE


- *Presión
- *Fricción
- *Fuerza de rozamiento o cillamiento

FACTURAS PREDISPONENTE

*Inmovilidad, presencia de humedad cutánea, déficit de higiene, desnutrición, anemia, fiebre, alteraciones hemodinámicas, envejecimiento.

MEDIDAD PREVENTIVAS.

- Examinar la piel revisando los puntos de presión cada turno.
- Realizar cambios postulares cada 3 horas si la movilidad/ actividad es < 2 , siguiendo una rotación programada
- Mantener la piel seca y limpia
- Aseo diario y cuando precise
- Hidratación de la piel
- Déficit nutricional



Paracentesis

Procedimiento invasivo que consiste en realizar una punción en la cavidad abdominal con técnica estéril para obtener líquido ascítico con fines diagnósticos y terapéuticos

Toroconcentesis

Consiste en la punción puntual de la pared torácica para la retirada de líquidos y aire del espacio pleural, mediante aguja fina hueca o catéter sobre aguja.

Punción lumbar

Se realiza en la parte baja de la espalda en la región lumbar, se introduce una aguja entre 2 huesos lumbares (vertebras) para extraer muestra de líquido cefalorraquídeo.

Pericardiocentesis

Es un procedimiento en el que se emplea una aguja para extraer líquido del saco pericardio.