



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**

MEDICINA COMPLEMENTARIA

“Tabla con la clasificación de los esteroides tópicos de acuerdo a su potencia y los tipos de inhibidos de calcineurina tópicos actuales y su mecanismo de acción”

Dr. Uriel Alejandro Guillen Morales

Grado: 7 semestre Grupo: “A”

Estudiantes:

Eduardo Ernesto Zavala Barco

17 de octubre del 2020

Comitán de Domínguez, Chiapas

POTENCIA BAJA

HIDROCORTIZONA 1%, 2.5%
(LACTISONA)

FLUOCORTINA 0.75%
(VOSPIT)

DEXAMETASONA 1%, 2%

DESONIDA 0.005%

POTENCIA INTERMEDIA

VALERATO DE BETA METASONA 0.1%

FURATO DE MOMETASONA 0.1%

PREDNICARBATO 0.25%

ACETONATO DE HIDROCORTIZONA 0.1%

DEXAMETASONA 1%, 2%

TRIAMINOLONA ACETONICO

POTENCIA ALTA

BETA METASONA DIPROPIONATO 0.5%, 0.25%

BUDESONIDA

DIFLUOCORTOLONA VALERATO

MOMETASONA

PREDNICARBATO

ACETONIDO DE FLUCINOLONA 0.005%

ACETONATO DE METILDREONISOLONA

PREDNICARBATO 0.25%

FURATO DE MOMETASONA 0.1%

POTENCIA Muy ALTA

CILOBETASOL

ACETONIDO DE FLUCINOLONA

HALCINONIDO 0.1%

TIPOS DE INHIBIDORES DE LA CALCINEURINAS TÓPICOS ACTUALES Y SU MECANISMO DE ACCION

MECANISMO DE ACCION

ESTOS SON INMUNO-MODULADORES SELECTIVOS COMO LAS LACTONAS DE LOS MACROLIDOS A TRAVES DE SU UNION A PROTEINAS EN LO QUE ES EL CITOPLASMA, QUE FORMANDO UN COMPLEJO QUE INHIBE LA ACTIVIDAD DE LA FOSFATASA DE CALCINEURINAS, IMPIDIENDO LO QUE ES LA ACTIVACION DE LOS LINFOCITOS T LA TRASCRIPCION DE CITOPLASMA Y MEDIADORES DE MASTOCITOS Y BASOFILUS EN LA PIEL.

TACROLIMUS

PIRECROLIMUS

SIBORIMUS

CICLOSPORINA A