



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Título del trabajo:

Mapa conceptual de clasificación de Lepra.

Nombre del alumno: Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Nombre de la asignatura: Clínicas complementarias

Semestre y grupo: Séptimo semestre grupo A

Nombre del profesor: Dr. Uriel Alejandro Guillen Morales.

Lugar y fecha: Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de Noviembre del 2020.

Lepra Clasificación

2 Polares

2 Inestables

Lepromatosa

Tuberculosa

Indeterminada

Dismorfa

Más común en hombres

Es este polo de la enfermedad se presentan principalmente:

Se podría definir como:

(BORDERLINE)

Lesiones circunscritas
- Afecciones cutáneas bilaterales muy variables (maculas, nódulos, placas o pápulas).
- Lesiones de bordes definidos y centros elevados

Maculas y nódulos de bordes bien definidos escamosas e hipopigmentadas

Es el inicio de la enfermedad donde no se conoce en cual de los polos del espectro clínico inmunológico se va a ubicar

Es un tipo clínico de la lepra el cual se dice que no es preciso con respecto a alguno de los polos

Se caracteriza:

Placas infiltradas cutáneas en omóplatos, nariz, cejas, codos, oídos, muñecas, nalgas y rodillas.

crecen por extensión periférica

sus bordes se alzan (aspecto circinado) el área central se ulcera (unilaterales)

Datos clínicos:

- 1 o varias maculas
- Placas hipo- hiperpigmentadas anestésicas o no (principalmente en cara)
- Las lesiones suelen desaparecer al cabo de uno o dos años

puede cambiar de uno a otro polo.

Se caracteriza por:
- Placas infiltradas con eritema y escamosas que tienden a aumentar de tamaño en número y heterogeneidad, pero tienden a disminuir de tamaño cuando se acerca el período de lepra lepromatosa, en cara toman la forma de alas de mariposa

Perdida del centro de la ceja

Engrosamiento y fruncimiento de la piel de la cara y frente (fascies leonina)

Las lesiones muy desarrolladas:

- Gran anestesia (macula anestésica)
- Desaparecen glándulas sudoríparas, y f. pilosos por ahogamiento de la piel
- Únicas o num. Reducido

En cara y manos, cong. Nasal y en ocasiones afección en cejas.
- El daño nervioso es severo cuando se acerca al polo Tb.
- Cuando las características clínicas se asemejan o tienden al polo Tb, se denomina lepra dimorfa tuberculoides.

Existe edema