



Universidad del Sureste

Medicina Humana

Mapa Conceptual de la clasificación de Lepra

Ana Ingrid Gordillo Mollinedo

Nombre de la asignatura: Clínicas Médicas Complementarias

Semestre y grupo: 7°B

Docente: Dr. Uriel Alejandro Guillén Morales.

Comitán de Domínguez, Chipas a; 30 de noviembre de 2020.

Lepra o Enfermedad de Hansen

Periodo de incubación

De 2 a 10 años.

Enfermedad infecciosa que afecta la piel y nervios periféricos.

Agente

Mycobacterium Leprae

L. dimorfa TB

L. dimorfa

L. dimorfa LP

Tuberculoide

Clasificación clínica

Lepromatosa

Más común en hombres.

Máculas y nódulos de bordes bien definidos escamosos e hipopigmentados.

Crecen por extensión periférica, bordes alzados (circinados), el área central se ulcera.

L. dimorfo, bordeline o difusa

Afecciones cutáneas bilaterales variables (máculas, nódulos, placas o pápulas).

Bordes definidos y centro elevados, placas infiltradas, pérdida de cejas, fascie leonina.

Afectan el SNP: nervio cubital, peroneo, auricular mayor, mano en garra.

Mácula anestésica en lesiones desarrolladas.

Puede cambiar de uno a otro polo.

Placas infiltradas con eritema y escamosas.
Cara en forma de luna en fase sucultenta.
Fase atrófica aspecto seco, plegado con descamación.