



Presentado por: Ávila Delesma Clara del Rosario.

Nombre del profesor: Lic. Rosario Cruz Sánchez.

Nombre del trabajo: Plan de cuidados, “Infección de Vías Urinarias”.

Materia: Fundamentos de Enfermería II.

Grado: 2° Cuatrimestre, Enfermería.

Pichucalco, Chiapas a 08 de abril de 2021

Paciente con Infección de vías Urinarias.

- **Valoración:** Paciente que refiere fiebre de dos días quejumbroso acompañado de dolor intenso en el área pélvica, con datos de disuria, dolor renal y dolor a la palpación.
- **Diagnóstico:** Infección de vías Urinarias.
- **Planificación:** Administración de esquema de antibióticos, realización de estudios de laboratorios y estudios de gabinete.
- **Ejecución:** Administrar lo siguiente: Nitrofurantoina 100 mg tabletas 1 c/8 horas por 7 días. Fenazopiridina 100 mg tabletas 1 c/8 horas por 5 días. Clonixinato de lisina-butilhioscina 250 mg-10 mg tabletas 1 c/8 horas por 5 días. Realizar: examen general de orina, química sanguínea.
- **Evaluación:** Paciente que evoluciona favorablemente al tratamiento con notable disminución de dolor en el área pélvica, desaparece fiebre.

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA

DOMINIO: 11. Seguridad/Protección.	CLASE: 1. Infección.	RESULTADO (NOC) Control de la infección.	INDICADOR <ul style="list-style-type: none"> • (184204) Signos y síntomas de la infección. • (184206) Procedimientos de control de la infección. • (184209) Tratamiento de la infección diagnosticada 	ESCALA DE MEDICIÓN 2 - 3 3 - 4 2 - 3	PUNTACIÓN DIANA Mantener a: 7 Elevar a: 10
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA NANDA					
ETIQUETA (PROBLEMA) (p): Dolor agudo. FACTORES RELACIONADOS (CAUSAS) (E): Retención de los fluidos corporales. CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS (Signos y Síntomas): <ul style="list-style-type: none"> • Dolor pélvico. • Disuria. • Dolor renal. • Fiebre. 					
INTERVENCIÓN (NIC)		INTERVENCIÓN (NIC)			
ACTIVIDADES		ACTIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Poner en práctica precauciones universales. ○ Usar guantes según lo exigen las normas de precaución universal. ○ Enseñar al paciente a obtener muestras de orina a mitad de la micción al primer signo de reaparición de los síntomas, según corresponda. ○ Ordenar al paciente que tome antibióticos según prescripción. 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 			