



**Nombre de alumnos: Karen Jazziel
Bautista Peralta**

**Nombre del profesor: Lic. Nancy
Domínguez**

Nombre del trabajo: Valoraciones

**Materia: Enfermería del niño y del
adolescente**

Grado: 5to. Cuatrimestre

Grupo: Ú

INTRODUCCIÓN

Trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo.

El síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21.

El síndrome de Down se caracteriza por una apariencia física típica, discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. Además, puede estar asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula tiroideas.

El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación.

Tabla de contenido

PRESENTACIÓN	1
INTRODUCCIÓN	2
ÍNDICE	3
VALORACIONES	4
CONCLUSIÓN	5
BIBLIOGRAFÍA.....	6

VALORACIONES

SINDROME DE DOWN

Paciente masculino de 5 años de edad, con peso adecuado a edad, con cara aplanada, ojos en forma almendrada rasgados hacia arriba, con presencia de manchas blancas en la iris, cuello corto y orejas pequeñas, manos y pies pequeños, con un solo pliegue palmar, tono muscular débil, altura más bajada de lo normal, con higiene adecuada, sin alergias, con 1 ingreso hospitalario, rara vez asiste a revisiones, estado vacunal adecuado, con hábitos saludables, entorno físico adecuado, sufre mal oclusión lo que provoca dificultad para tragar y masticar, con buena coloración de piel, adecuada nutrición, hábitos nutricionales adecuados, sin alteraciones en la piel, sin problemas de eliminación intestinal, sin problemas de micción, con estado motriz adecuado.

AUTISMO

Paciente masculino de 10 años de edad, con peso y altura adecuados a edad, cabello y cejas bien implantados, mayor amplitud en la parte superior de la cara, se encuentra activo y reactivo a estímulos, nariz y boca bien definidas, con una distancia más corta entre las partes superior e inferior de la cara, una región media más corta, boca amplia y de mayor tamaño y el surco nasolabial iniciando por debajo de la nariz hasta la parte superior del labio, se encuentra retraído, evita el contacto visual, presenta retrasos en las destrezas del habla y el lenguaje, repite frases una y otra vez, reacciones poco habituales al sonido, el olor, el gusto, el aspecto o el tacto de las cosas.

1. Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
2. Instituciones Federadas Down España.
3. William I. Cohen, Editor Down Syndrome Medical Interest Group1.
4. Joana Fornés Vives.
5. Johnson, C.P. Early Clinical Characteristics of Children with Autism. In: Gupta, V.B. ed: Autistic Spectrum Disorders in Children. New York: Marcel Dekker, Inc., 2004:85-123.
6. Aydé Patricia Torres Juárez