CATEDRATICO:

VICTOR MANUEL NERY GONZALEZ

ALUMNA:

AZUCENA RAMIREZ HERNANDEZ

TRABAJO:

MAPA CONCEPTUAL CAMBIOS FISIOLOGICOS MATERNOS EN PARTON Y SISTEMAN EN PARTO

MATERIA:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

GRADO:

5 CUATIRMSTRE

11 de febrero de 2021

CAMBIOS FISIOLOGICOS MATERNOS EN PARTON Y SISTEMAN EN PARTO

La gestación es un periodo en el que se incrementan notablemente las necesidades nutritivas. Este incremento se debe por un lado a las demandas requeridas para el crecimiento y desarrollo del feto

a la formación de nuevas estructuras maternas necesarias para la gestación (placenta, útero, glándulas mamarias, sangre), así como para la constitución de depósitos de energía, que aseguren las demandas calóricas que van a presentarse durante

La Pelvis es la región anatómica más inferior del tronco. Siendo una cavidad, la pelvis es un embudo osteomuscular que se estrecha hacia abajo, limitado por el hueso sacro, el cóccix, los iliacos y los coxales (que forman la cintura pélvica) y los músculosde la pared

los cambios psicológicos son muy frecuentes sobre todo en el primer embarazo estados depresivos (llanto fácil) e irascibilidad

Todos estos cambios son consecuencia de la acción de las hormonas aumentadas durante el embarazo. Se segregan cantidades importantes de estrógeno, progesterona, lactógeno placentario humano o gonadotropina coriónica

Es aconsejable que la mujer tenga un peso adecuado antes del embarazo, puesto que durante la gestación es normal que engorde de 9 a 12 Kg: 1,5 a 1,8 Kg durante el primer trimestre; unos 3,5 Kg suplementarios en el segundo y el resto en el tercero (0,4 Kg/semana)

El organismo de la mujer gestante desarrolla un mecanismo compensador orientando al aumento del peso inicial hacia la reserva de grasa que la mujer podrá utilizar cuando aumenta la demanda energética del feto a medida que avanza el embarazo