

Enfermedades Cutaneas En Cerdos

Dermatitis exudativa

Lesiones cutáneas causadas por una infección de la bacteria staphylococcus hyicus.

Las lesiones que se presentan primero son áreas oscuras en la piel, que se extienden y se vuelve escamosas con una sensación grasosa.

Se utilizan antibióticos para tratar la infección, junto con protectores de la piel, las vacunas autogenas se utilizan para prevenir esta condición.

Mejorar la higiene y limpieza

Pitiriasis rosea

Es una dermatitis no contagiosa en cerdos jóvenes de 3 a 16 semanas de edad.

Se caracteriza por lesiones similares a las de la tiña, coalescentes, grandes.

Las lesiones son circulares y suelen empezar en el abdomen y en caso graves afecta a todo el cuerpo.

Control y Prevención

Ninguno, el cuadro se resuelve por si mismo de 6 a 8 semanas.

Dermatitis Necrotizante

Infección por circovirus porcino tipo 2. Se desarrolla en cerdos adultos. Las lesiones macroscópicas en la piel suele ser evidentes. Pueden encontrarse hemorragias en las superficies serosas.

La vacunación en países afectados, es obligatorio dado su gran eficacia.

Haematopinus suis

Irritación de piel
Anemia
Lesiones rojas en la piel
cerdos peludos

El haematopinus suis es el piojo de cerdos que puede causar anemia y es la principal vía de transmisión para la viruela porcina.

Son susceptibles a muchos insecticidas, su uso requiere una segunda aplicación de 10 a 20 días, para romper el ciclo de producción.

Epiteliogenesis Imperfecta

Condición congénita en la cual el lechón nace desprovisto de áreas de piel(Es poco frecuente)

Es una anomalía del desarrollo En lechones lactantes

No existe control y Prevención ya que el caso es esporádico.

si las áreas afectadas son pequeñas cicatrizaran gradualmente.

EN CASOS GRAVES LOS LECHONES DEBEN SER EUTANASIADOS.